

FEDERACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL DEPORTIVA ESPAÑOLA

JUECES F.O.C.D.E.



ESTÁNDAR OFICIAL DE ENJUICIAMIENTO

COMISIÓN TÉCNICA FAUNA DE EUROPEA

FEDERACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL DEPORTIVA
ESPAÑOLA
COLEGIO DE JUECES (FOCDE)
COMISIÓN TÉCNICA DE FAUNA EUROPEA
ESTÁNDAR OFICIAL DE FAUNA EUROPEA



ÍNDICE

- Ampelis Europeo
 - Arrendajo Común
 - Camachuelo Carminoso
 - Camachuelo Común y mutaciones
 - Camachuelo Picogruoso
 - Camachuelo Trompetero
 - Corneja Cenicienta
 - Corneja Negra
 - Escribano Cabecinegro
 - Escribano Cerillo
 - Escribano Hortelano
 - Escribano Montesino
 - Escribano Palustre
 - Escribano Sotefío
 - Estornino Pinto
 - Gorrión Alpino
 - Gorrión Chillón
 - Gorrión Común y mutaciones
 - Gorrión Italiano
 - Gorrión Molinero y mutaciones
 - Gorrión Moruno
 - Graja
 - Grajilla
 - Jilguero
 - Lugano y mutaciones
 - Mirlo Capiblanco
 - Mirlo Común y mutaciones
 - Pardillo Común
 - Pardillo de Hornemann
 - Pardillo Piquigualdo
 - Pardillo Sizerín y mutaciones
 - Picogordo
 - Pinzón Real
 - Pinzón Vulgar y mutaciones
 - Piquituerto Común
 - Piquituerto Frangeado
 - Piquituerto Lorito
 - Roquero Solitario
 - Triguero
 - Urraca
 - Verdecillo
 - Verderón Común y mutaciones
 - Verderón Serrano
 - Zorzal Alirrojo
 - Zorzal Charlo
 - Zorzal Común y mutaciones
 - Zorzal Real
- Cuadro de Mutaciones y Aberraciones de la Fauna Europea

MUTACIONES Y ABERRACIONES DE LA FAUNA EUROPEA

	MUTACIONES	ABERRACIONES
ARREDAJO COMÚN <i>(Garrulus Glandarius)</i>	Opal.	
CAMACHUELO COMÚN <i>(Pyrrhula Pyrrhula)</i>	Pastel, bruno, alas diluidas, perlado (modificación de la distribución melánica, diseño lizard).	
CORNEJA NEGRA <i>(Corvus Corone)</i>	Plata.	Albinismos parciales (alas blancas, alas y colas diluidas).
ESTORNINO PINTO <i>(Sturnus Bulgaris)</i>	Bruno, blanco, plata.	Ágata, opal.
GORRIÓN COMÚN <i>(Passer Domesticus)</i>	Bruno, ágata, isabela, opal, pastel, phaeo, blanco, albino ivoire, lutino marfil, satiné.	Pío, ala blanca, alas y colas blancas, alipócromos, albino, amarillos.
GORRIÓN MOLINERO <i>(Passer Montanus)</i>	Bruno, ágata opal.	
JILGUERO <i>(Carduelis Carduelis)</i>	Bruno, ágata, satiné, pastel.	Blanco, pío, negro, pastel, alas grises, albino, phaeo, isabela.
LUGANO <i>(Carduelis Spinus)</i>	Bruno, ágata, isabela, amarillo, diluido (verde bruno, ágata, isabela), doble dilución (los mismos que el anterior).	Blanco, negro, gris.
MIRLO COMÚN <i>(Turdus Merula)</i>	Bruno, isabela, opal, albino, blanco, pío, satiné.	Albinismos parciales (¿alimentación?)

PARDILLO COMÚN (<i>Acanthis Cannabina</i>)	Bruno	Blanco, isabela, amarillo (en cautividad el macho pierde el rojo del pecho y frente a causa de alotropía).
PARDILLO DE HORNEMANN (<i>Acanthis Hornemanni</i>)	Bruno, ágata.	Amelánicos parciales.
PARDILLO SIZERÍN (<i>Acanthis Flamea</i>)	Bruno, ágata, isabela, perlado.	Blanco, amarillo.
PINZÓN VULGAR (<i>Fringilla Coelebs</i>)	Bruno, ágata, isabela, opal.	Amelánicos totales o parciales.
TRIGUERO (<i>Emberiza Calandra</i>)	Isabela, bruno, lutino.	Albinismos parciales (en jaula es causa frecuente de alotropía mudando cada vez más en blanco).
URRACA (<i>Pica Pica</i>)	Bruna, isabela, blanca, pastel.	
VERDECILLO (<i>Serinus Serinus</i>)	Isabela satiné.	Pastel, amarillo, albinismos parciales en alas y cola.
VERDERÓN COMÚN (<i>Carduelis Chloris</i>)	Bruno, ágata, isabela, lutino, isabela-satiné, pastel.	Opal, plateado, marfil, mulato (nombre dado en el sur de Andalucía al ser más oscuro, dorso, color achocolatado, cejas y bigotes en amarillo diluido, así como en las alas y cola el amarillo está diluido casi rozando el blanco).
ZORZAL COMÚN (<i>Turdus Thilomelos</i>)	Bruno, albino.	Isabela.

AMPELIS EUROPEO

(*Bombyscilla garrulus*)



Características del macho

PICO	Negro con un color carne en la raíz; una línea blanca está visible en la base de la mandíbula inferior
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Posee un moño de plumas eréctiles de color vino; frente, lore, trazos superciliares, mentón y garganta negras; el color de la frente y de delante de las mejillas es rojizo; la región auricular, las mejillas, el alto del pecho y el occipucio son color de vino
ESPALDA	Manto, escapulares y coberteras alares son de un color bruno oscuro, desvaneciéndose en gris sobre las sub-caudales
PECHO	Gris-brunáceo pálido
VIENTRE Y FLANCOS	Gris-brunáceo pálido; el centro del vientre es amarillento
ALAS	Las rémiges primarias son negras bordeadas de una línea blanca con la extremidad de la orilla externa amarilla; las rémiges secundarias son de un color negro grisáceo y a lo largo de toda la extremidad una larga mancha blanca terminada por pequeñas paletas córneas de un rojo vivo (8 paletas)
COLA	Rectrices grises en la raíz cambiando gradualmente a negruzco; la extremidad de las rectrices es amarilla; esto hace que forme una banda amarilla en la extremidad de la cola; sub-caudales rojizas
PATAS, DEDOS Y UÑAS	Negras

Características de la hembra

La hembra posee el mismo plumaje que los machos pero el manto y las escapulares son más grisáceas. El mentón y la garganta de un negro menos oscuro. Las paletas córneas rojas son más pequeñas y pueden estar ausentes. Las rectrices tienen las extremidades amarillas más cortas.

Defectos clásicos del ampelis europeo en machos y hembras

- Barbilla irregular
- Dibujos de las alas: extremidades amarillas y bordes blancos asimétricos
- Paletas rojas insuficientes (mínimo 3 a cada lado)
- Banda amarilla de la cola irregular
- Color del pecho no uniforme

Diámetro máximo de la anilla: 4 mm

ARRENDAJO COMÚN



(*Garrulus glandarius*)

Características del macho y de la hembra

PICO	De color gris oscuro
OJOS	De color azul claro con círculo ocular bruno
CABEZA	Plumaje claro escarchado de rosa y estriado de negro el cual puede elevarse en forma de mono
NUCA	De color rosa-bruno
BIGOTES	Largos bigotes negros
ESPALDA Y MANTO	De color rosa bruno
SUB-CAUDALES	Blancas
GARGANTA Y MENTÓN	Blanco sucio
REGIÓN AURICULAR	De color rosa-bruno pero más blancuzco debajo del ojo
PECHO	De color rosa bruno más claro
FLANCOS	De color rosa-bruno más claro
VIENTRE	Blanco sucio
SUS-CAUDALES	Blanco sucio
ALAS	Rémiges primarias negro-bruno con un reflejo grisáceo a lo largo de la orilla externa; las rémiges secundarias son negras y forman un espejo blanco bordeado de azul; las coberteras sus-alaes son azules con barras negras; primera terciaria negra con una mancha bruna-castaño
OBISPILLO	Blanco
COLA	De color negro
PATAS	Bruno pálido
DEDOS	Bruno pálido
UÑAS	Negras

Observaciones

Las tres primeras rémiges primarias son gradualmente más cortas que las siguientes: esto no es un defecto

Defectos clásicos del arrendajo común en machos y hembras

- Bigotes irregulares
- Dibujo de lo alto de la cabeza irregular
- Lunar o espejo de color impuro
- Dibujos de las alas irregular
- Color del pecho irregular
- **Diámetro máximo de la anilla: 6,2 mm**

CAMACHUELO PICOGRUESO

(*Pinicola enucleator*)



Características del macho

PICO	Gris-negro, poderoso, mandíbula superior bombeada, la extremidad curvada hacia la base en forma de gancho
OJOS	Negros
CABEZA	Bastante estrecha y plana, rosa-carmín, reflejos gris-negrucos sobre la zona loreal y ocular
CUELLO	Aspecto ancho y poderoso, nuca poco marcada; rosa-carmín
ESPALDA	Ancha, rosa-carmín, marcada de un escamado gris-negrucos muy regular
PECHO	Enteramente rosa-carmín
FLANCOS	Estrecha banda gris ligera subrayando el ala
VIENTRE	El rosa del pecho se degrada en gris-blancuzco, más claro sobre la zona anal
ALAS	Rémiges primarias negruzcas teniendo un fino ribete gris sobre todo el largo externo; rémiges secundarias negruzcas anchamente ribeteadas de blanco, sobre todo en la extremidad; coberteras negras con borde blanco formando una doble barra alar muy distinta
OBISPILLO	Rosa-carmín
COLA	Bastante larga y sesgada; rectrices negruzcas llevando un ribete muy débil gris-bruno
PATAS, DEDOS Y UÑAS	Gris-negro
FORMA GENERAL	Poderoso y elegante

Observaciones

La intensidad del rosa-carmín puede variar de un sujeto a otro o ser reemplazado por un naranja-ladrillo. En plumaje juvenil (primer año de vida) el rosa-carmín está reemplazado por un naranja más o menos intenso, el escamado dorsal es menos neto.

Características de la hembra

Los colores son más tenues y el rosa-carmín está reemplazado por un tono gris-amarillento más o menos naranja según los individuos. El obispillo es gris.

Defectos clásicos del camachuelo picogrueso en machos y hembras

- Escamado dorsal irregular
- Falta de uniformidad en el color
- Barras alares irregulares
- Falta de elegancia y de poderío
- **Diámetro máximo de la anilla: 3,5 mm**



CAMACHUELO CARMINOSO

(*Carpodacus erytrinus*)



Características del macho

PICO	Color cuerno, cónico y bien equilibrado
OJOS	Negros
CABEZA	Fino, elegante, cráneo elíptico; carmín color de vino sobre la cara, las mejillas, el casquete craneano y el mentón
CUELLO	Nuca ligeramente encajonada, bruno teñido de rojo, garganta carmín color de vino
ESPALDA	Bruno, ligeramente marcado de estrías oscuras, ligeramente mezclada de rojo
PECHO	Carmín color vino degradándose en beige-rosáceo
FLANCOS	Gris-beige teñidos de rosa-carmín
VIENTRE	Gris-beige aclarándose en la zona anal
ALAS	Rémiges bruno-negruczas ribeteadas de beige; coberteras bruno-negruczo con un ancho ribete bruno teñido de rosa, dibujando una doble barra alar clara
OBISPILLO	Carmín color vino intenso
COLA	Rectrices bruno-negruczas ribeteadas de beige, unidas sobre la cara interna
PATAS	Bruno oscuro; bastante largas
DEDOS	Bruno oscuro
UÑAS	Gris-negro
FORMA GENERAL	Altivo, esbelto y elegante
NOTA	La intensidad y la extensión del rojo carmín puede variar de un individuo a otro

Características de la hembra

La hembra está desprovista de rojo. La cara dorsal y la cabeza son brunas. El pecho y los flancos son brunos-beige.

Defectos clásicos del camachuelo carminoso en machos y hembras

- Excesiva coloración en los machos, el rojo presenta un aspecto más tenue o violáceo
- Falta de regularidad en el dibujo
- Falta de elegancia en la forma

Diámetro máximo de la anilla: 3 mm

CAMACHUELO COMÚN

(*Pyrrhula pyrrhula*)



Características del macho

PICO	Negro, corto y muy abombado con la extremidad de la mandíbula superior ligeramente curvada
OJOS	Negros
CABEZA	El color de la calota y en torno al pico es negro mate hasta debajo de los ojos; la calota cubre todo el cráneo hasta la nuca
CUELLO	La nuca es corta y bien rellena de color gris
ESPALDA Y HOMBROS	De color gris ceniciento
GARGANTA, PECHO Y FLANCOS	El color rojo amapola está regularmente repartido sobre la garganta, el pecho y los flancos y ella está delimitada por el casquete negro debajo de los ojos
VIENTRE	Bajo del abdomen y subcaudales son blancos
ALAS	Las rémiges primarias igual que las secundarias son de un negro brillante con reflejos azulados; las coberteras blancuzcas forman una banda alar que partiendo del borde externo del ala y se alarga sobre la espalda. Dos pequeñas plumas rojas adornan la extremidad de las rémiges terciarias
OBISPILLO	Blanco
COLA	Las rectrices son negro brillante con reflejos metálicos en la parte superior, negro mate en la parte inferior
PATAS, DEDOS Y UÑAS	Negras

Características de la hembra

Las hembras tienen las mismas características que los machos pero los colores son más tenues.



ESPALDA	Gris-brunáceo
PECHO	Gris-beige vinoso

Defectos clásicos del camachuelo común en los machos y hembras

- Casquete dentado sobre la nuca
- Barbilla irregular bajo el mentón
- Reflejos blancuzcos alrededor de los ojos
- Color del pecho irregular
- Barra alar irregular
- Plumas rojas del ala ausentes
- Oquedad en la nuca

Diámetro máximo de la anilla: 2,5 mm

CAMACHUELO COMÚN (Mutación Pastel)



Características del macho

PICO	Bruno-negruzco
OJOS	Castaños oscuros
CABEZA	Calota de color gris-negruzco, mejillas de color rosado
ESPALDA Y HOMBROS	De color gris pastel (gris muy luminoso)
PECHO	De color rosa salmón
VIENTRE	El bajo del abdomen y las subcaudales son blancas
ALAS	Las rémiges primarias y secundarias son de color gris oscuro; barra alar de color gris-beige claro; manchas rojas sobre las rémiges terciarias
OBISPILLO	Blanco
COLA	De color gris oscuro
PATAS Y DEDOS	Bruno oscuro
UÑAS	Oscuras

Características de la hembra

La hembra presenta las mismas características que el macho, pero el color del manto y del pecho es gris-beige claro.



Defectos clásicos del camachuelo común macho y hembra

- Rémiges y rectrices demasiado coloreadas o bicolors
- Falta de uniformidad en el color del pecho
- Dibujo malo o mal limitado

CAMACHUELO TROMPETERO

(*Rhodopechys githaginea*)



PICO	Naranja, corto, poderoso, bastante ancho en la base
OJOS	Negros
CABEZA	Bastante ancha, débilmente redondeada, de forma elegante; cuello bastante largo; nuca marcada; color gris-plateado
ESPALDA	Gris-brunáceo
PECHO	Gris con ligero reflejo rosa vinoso
FLANCOS	Del mismo color gris del pecho
VIENTRE	Como el pecho, salvo en la zona anal color gris-claro
ALAS	Largas y finas, rémiges primarias gris-oscuro; rémiges secundarias y coberteras gris-bruno; la orilla externa de las rémiges y de las coberteras llevan un estrecho ribete claro
COLA	De longitud mediana; ligeramente sesgada; rectrices gris-oscuro bordeadas de un ribete claro
PATAS	Bastante largas, finas, color carne
DEDOS	Color carne
UÑAS	Gris beige
FORMA GENERAL	Pájaro de forma elegante y fina, esbelto de porte erguido; plumaje fino, bien adherido al cuerpo

Observaciones

En periodo de reproducción el cráneo se vuelve gris-plata; la cara, garganta y el pecho se cubren de un tinte rosa-carmín, la espalda, el obispillo y el ribete de las alas se vuelven rosas, así como la cola; el pico se vuelve rojo.

Características de la hembra

Bastante semejante al macho. Color ligeramente más mate o atenuado. El pecho está marcado de estrías grises oscuras, cortas y muy finas, que se funden en el color general del plumaje.

Defectos clásicos del camachuelo trompetero machos y hembras

- Plumaje desordenado
- Alas caídas o colgantes
- Cola ostentosa
- **Diámetro máximo de la anilla: 2,7 mm**



CORNEJA CENICIENTA

(*Corvus corone cornix*)



Características del macho y de la hembra

PICO	Negro, largo, solido, puntiagudo; mandíbula superior encorvada sobre la base del pico a la punta; cerdas o pelos eréctiles
OJOS	Negros
CABEZA	Bastante plana; corte nítido detrás del cráneo; frente, cima del cráneo hasta la nuca, mejillas y mentón negros
CUELLO Y NUCA	Corto y grueso; nuca gris-ceniza, netamente delimitada del negro de la cabeza
ESPALDA	Gris-ceniciento; puede tener trazos negruzcos
FLANCOS Y VIENTRE	Gris-ceniciento
GARGANTA	Gris-ceniciento, el límite con el plastrón es más o menos nítido
ALAS	Bastante largas, negras irisadas de reflejos metálicos
OBISPILLO	Gris
COLA	De mediana longitud, derecha, negra irisada
PATAS	Robustas, muslos bien sueltos, negros
DEDOS Y UÑAS	Negros
FORMA GENERAL	Porte robusto, bastante alto sobre las patas

Defectos clásicos de la corneja cenicienta en machos y hembras

- Dibujo mal delimitado
- Colores bastante apagados o emborronados
- Falta de claridad de los reflejos sobre las alas y la cola

Diámetro máximo de la anilla: 7,2 mm

CORNEJA NEGRA

(*Corvus corone corone*)

Características de macho y de la hembra



PICO	Negro; pelos eréctiles negros; punta de la mandíbula superior más o menos curvadas
OJOS	Negros
PLUMAJE DEL CUERPO	Enteramente negro con reflejos azulados
GARGANTA	Las plumas de los lados del cuello y de la garganta son un poco alargadas y puntiagudas
ALAS	Las rémiges primarias y secundarias son negras con reflejos azules
COLA	Las rectrices son negras y la forma de la cola es derecha
PATAS, DEDOS Y UÑAS	Negras

Defectos clásicos de la corneja negra en macho y hembras

- Pelos o cerdas eréctiles del pico estropeadas
- Falta de brillo o lustre

Diámetro máximo de la anilla: 7,2 mm

ESCRIBANO CABECINEGRO

(*Emberiza melanocephala*)



Características del macho

PICO	Bruno-negruzco
OJOS	Negros
CABEZA	Casquete craneano, desde la base del pico hasta la nuca, y mejillas enteramente negro liso, netamente delimitado de amarillo-limón del mentón y la garganta; nuca amarilla velada de bruno; el velo bruno se desborda ligeramente sobre el pecho y a la altura del hombro
ESPALDA	Bruno-rojizo liso
PECHO, FLANCOS Y VIENTRE	Amarillo-limón luminoso y uniforme
ALAS	Escapulares, coberteras y rémiges secundarias gris-negruzcas profusamente ribeteadas de gris beige claro sobre todo el contorno; grandes rémiges negruzcas teniendo una fina marca clara sobre la orilla externa
OBISPILLO	Marrón teñido de amarillento
COLA	Bastante larga, ligeramente sesgada; rectrices negruzcas ligeramente más claras en su contorno en la cara externa; la cara interna es gris oscura escarchada de amarillo
PATAS Y DEDOS	Gris-beige
UÑAS	Gris-negro
FORMA GENERAL	Pájaro esbelto, de silueta elegante y de colores bien trazados

Características de la hembra

De tinte general gris-beige claro. La cabeza y la espalda están marcados de estrías finas e irregulares. Obispillo bruno. Cejas claras bastante marcadas que resaltan sobre el dibujo de las mejillas. Garganta crema-amarillento bastante luminoso: ligera su-fusión bruna en lo alto del hombro. Cara ventral gris-beige claro limpio. Región anal amarillenta. El dibujo del ala es idéntico al de los machos pero de colores más tenues.

Defectos clásicos del escribano cabecinegro en machos y hembras

- Dibujo mal delimitado
- Falta de intensidad de los colores en el macho
- Estrías dorsales irregulares o apagadas en la hembra

Diámetro máximo de la anilla: 2,7 mm


ESCRIBANO CERILLO

(*Emberiza citrinella*)

Características del macho



PICO	Grisáceo
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Amarillo-limón, con un dibujo en forma de V de color brunáceo partiendo de la frente y se prolongan en su huida sobre la nuca; el dibujo de las mejillas es en forma de herradura, los brazos vuelven sobre delante y forman un trazo ocular y los bigotes de color brunáceo
ESPALDA	Nuca verdosa; el manto y las escapulares son de un color bruno-verdoso con estrías bruno-negro
GARGANTA	Amarillo-limón
PECHO	Alto del pecho bruno con reflejos verdosos; el medio y los lados son amarillos velados de rojo-bermellón
VIENTRE	Amarillo-limón
FLANCOS	Ligeramente estriados de rojo-bermellón
ALAS	Rémiges bruno-negruzcas con un estrecho ribete amarillo claro a lo largo de la orilla externa ligera banda alar formada por las coberteras medianas ribeteadas de amarillo claro (no blanco)
OBISPILLO	Rojo-bermellón
COLA	Rectrices bruno-negruzcas con las dos rectrices externas marcadas de una mancha blanca sobre los 2/3 de toda la longitud; las rectrices tienen un estrecho borde amarillento a lo largo de la orilla externa
PATAS Y DEDOS	De color carne
UÑAS	Brunas



Características de la hembra

La hembra es parecida al macho pero el color es más pálido en el conjunto; el amarillo del macho está reemplazado por un color más empañado; la cabeza, la espalda, el pecho y los flancos son más estriados que el macho; la hembra no tiene el dibujo típico de la V en la cabeza.

Observaciones


El color de fondo de la hembra puede variar de un amarillo pálido a un amarillo vivo.

Defectos clásicos del escribano cerillo macho y hembra

- Dibujo de la cabeza (V) irregular en los machos
- Estrías de flancos entrecortadas
- Dibujo de la mejilla irregular (herradura)
- Dibujo de la cola irregular o incompleta
- Barra alar blanca
- **Diámetro de la anilla 2,9 mm**

ESCRIBANO HORTELANO

(*Emberiza hortulana*)



Características del macho

PICO	Rosa, ligeramente grisáceo en la punta
OJOS	Negros
CABEZA	Fina, elegante, gris-verde-oliva, zona loreal y círculo orbital amarillo formando un anteojo bien visible; bigotes amarillos delimitado de verde-oliva, babero amarillo extendiéndose sobre el mentón y lo alto de la garganta
ESPALDA	Bruno estriado de negro
GARGANTA	Pechera verde-oliva extendiéndose sobre la base de la garganta y lo alto del pecho
PECHO	Verde-oliva después bruno-bermellón
FLANCOS	Bruno-bermellón liso
VIENTRE	Bruno-bermellón aclarándose en bruno amarillento sobre la zona anal
ALAS	Rémiges bruno-negruczas ribeteadas de bruno-bermellón; coberteras negruzcas bordeadas de gris-blancuzco formando dos barras alares indistintas
OBISPILLO	Bruno, ligeramente estriado
COLA	Rectrices bruno-negruczo con ribete bruno; de cada lado, dos rectrices externas llevan una mancha blanca ocupando más o menos la mitad inferior
PATAS	Color carne; bastante largas
DEDOS	Color carne
UÑAS	Gris-bruno
FORMA GENERAL	Muy elegante, bastante redondo

Características de la hembra

La hembra presenta una librea parecida a la del macho con contornos más mates y estrías más marcadas; el verde-oliva de la cabeza está reemplazado por un tinte gris-bruno estriado; todo el pecho es rojizo estriado de bruno; la garganta es amarilla finamente estriada de bruno.

Defectos clásicos del escribano hortelano macho y hembra

- Dibujo mal delimitado en la cabeza, la garganta y en el pecho
- Estrías irregulares o mal dibujadas
- Manchas blancas de la cola irregulares

Diámetro máximo de la anilla: 2,9 mm

ESCRIBANO MONTESINO

(*Emberiza cia*)



Características del macho

PICO	Gris-negrusco
OJOS	Negros
CABEZA	Fina, elíptica; nuca poco marcada; gris marcado de dos trazos longitudinales negros; cejas blancas delimitada por un trazo ocular negro que se reúnen detrás de las mejillas y se unen con el trazo de bigote partiendo de la comisura del pico; mejilla gris; mentón blanco; nuca y garganta grises
ESPALDA	Bruno-bermellónáceo estriado de negro
PECHO	Gris, después bruno-bermellón aclarándose gradualmente sobre el vientre
FLANCOS	Bruno-bermellón estriado de negro ligeramente
VIENTRE	Beige claro cambiando a blanquecino en la zona anal
ALAS	Rémiges primarias bruno-negrusco, rémiges secundarias ribeteadas de bruno sobre la orilla externa, grandes coberteras negras ribeteadas de blanco, coberteras primarias bruno negro con ribete beige en la extremidad; el conjunto forma dos barras alares
OBISPILLO	Bruno-bermellón uniforme
COLA	Rectrices bruno-negrusco ribeteadas de bruno en la extremidad; las dos rectrices externas son blancas
PATAS	Gris-bruno; bastante largas y finas
DEDOS	Gris-bruno
UÑAS	Gris-negro
FORMA GENERAL	Bastante largo, bien proporcionado, pecho bien redondeado

Características de la hembra

Parecida al macho pero más oscura. Tinte general bruno-bermejizo anchamente estriado de negro.

CABEZA	Fuertemente estriada sobre el cráneo; cejas beige; trazo loreal y bigotes ligeramente marcados
PECHO	Estriado de negro degradándose hacia el vientre beige liso y los flancos
ALAS	Barras alares menos marcadas que en los machos

Defectos clásicos del escribano montesino macho y hembra

- Dibujo de la cabeza mal delimitado
- Falta de nitidez en las estrías
- Barras alares irregulares
- Falta de claridad en el color de los machos
- **Diámetro de la anilla 2,9 mm**

ESCRIBANO PALUSTRE

(*Emberiza schoeniclus*)

Características del macho

PICO	Negro a negro brunáceo, manchado de negro en la parte superior
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	En verano: frente, vertex, occipucio, lados de la cabeza, mentón, garganta y centro del pecho de color negro. En invierno: las mismas partes son brunáceas; un dibujo en forma de herradura beige sobre la parte auricular, este dibujo parte de la base del pico reuniéndose detrás del ojo; los bigotes blancos se reúnen con un collar blanco en torno a la nuca en los machos adultos; doble bigote blanco y bruno oscuro sobre el collar blancuzco en los jóvenes machos
ESPALDA	Negro brunáceo con largas estrías rosadas oscuras
OBISPILLO	Bruno-grisáceo uniforme
PECHO	El alto del pecho es negro-brunáceo con estrías oscuras
VIENTRE	Blancuzco; sus-caudales grisáceas
FLANCOS	Blancuzco con estrías bruno-negruczas
HOMBROS	Castaño-rojizos
ALAS	Rémiges primarias bruno-negruczo ribeteadas de bermellón a lo largo de la orilla externa; rémiges secundarias terminadas por una extremidad más clara, dos bandas alares castaño-rojizos más claras
COLA	Rectrices de color negro-brunáceo con un borde estrecho bruno-amarillento el largo de la orilla externa excepto las rectrices medianas que son brunas; los dos pares de rectrices externas están marcadas de una larga mancha blanca en forma de media luna
PATAS Y DEDOS	Brunáceos
UÑAS	Negras

Características de la hembra

Tiene las mismas características que el macho excepto:



CABEZA Vertex bruno-bermellón estriado de negro; ancha ceja beige; mentón y garganta

más blancuzca; doble bigote blanco y negro; dibujo de las mejillas bruno-bermellón delimitado de blanco sobre en la zona posterior

FLANCOS

Estriado de anchas rayas negras

OBISPILLO

De un color bruno más oscuro

VIENTRE

Más beige que el macho y estriado de bruno-negro

Defectos clásicos del escribano palustre macho y hembra

- Cejas y mostachos irregulares
- Estrías de la espalda poco nítidas
- Estrías de flancos irregulares
- Manchas blancas de las rectrices externas asimétricas
- Barras alares irregulares

Diámetro máximo de la anilla: 2,7 mm

ESCRIBANO SOTEÑO

(*Emberiza cirrus*)



Características del macho

PICO	Bruno negruzco
OJOS	Negros
CABEZA	Elegante, bien proporcionada, nuca poco marcada; parte alta del cráneo gris-oliva; cejas amarillas trazo loreal negruzco, redondeándose detrás de la mejilla y trazando el dibujo de la garganta, mejillas amarillas, mentón y parte superior de la garganta negra delimitada por un medio collar amarillo; en invierno la garganta está franjeada de nevado (<i>schimmel</i>) gris
ESPALDA	Bruno-bermellón con estrías negras bordeadas de franjas más claras
PECHO	Plastrón verde-oliva limpio
VIENTRE	Amarillo pálido
FLANCOS	Alto de los flancos bruno-bermellón aclarándose en bruno claro ligeramente estriado de bruno oscuro
ALAS	Rémiges primarias negruzcas, rémiges secundarias y coberteras primarias negruzcas anchamente estriadas de bruno-bermellón, grandes coberteras negras bordeadas de blanco-amarillento
OBISPILLO	Bruno-verde-oliva claro, ligeramente estriado
COLA	Rectrices bruno-negruzcas más claro sobre la orilla externa, rectrices medianas blancas
PATAS Y DEDOS	Gris-beige
UÑAS	Grisáceo
FORMA GENERAL	Bien proporcionado, a la vez elegante y poderoso

Características de la hembra

Tinte general gris-beige; la cabeza, la espalda, el pecho y los flancos están estriados de bruno-negro; en torno a las mejillas y bigotes gris-bruno; una ligera su-fisión amarilla aparece en la garganta y en la cara ventral; obispillo bruno-oliva.

Defectos clásicos del escribano soteño. macho y hembra

- Falta de nitidez en el dibujo
- Falta de intensidad de los colores en el macho
- Estrías irregulares o indistintas

Diámetro máximo de la anilla: 2,9 mm

ESTORNINO PINTO

(*Sturnus vulgaris*)



verano

invierno

verano adulto

Características del macho y de la hembra

PICO	En verano: de color amarillo-limón con la base de la mandíbula inferior azul-gris en los machos y blanco-rosa en la hembra; En invierno: gris oscuro y amarillento en la base
OJOS	Bruno oscuro; los ojos no están en el centro de la cabeza, pero sí muy cercanos al pico
CABEZA Y ESPALDA	En verano: plumaje negro con reflejos metálicos. En invierno: cada pluma presenta un ribete gris-beige
VIENTRE Y FLANCOS	Brillante; presentando un dibujo punteado blanco o beige
ALAS	Negro brunáceo; el ribete de las rémiges primarias es grisáceo; las extremidades de las rémiges secundarias son de un color gris-brunáceo; las coberteras alares están terminadas y bordeadas de rojizo
COLA	Corta y negro-brunáceo
SUB-CAUDALES	Bien rellenas; de color oscuro con un dibujo típico formado por puntos de flecha grisáceos; la extremidad de las sub-caudales llega casi al final de la cola
PATAS Y DEDOS	De color bruno oscuro; rojo-bruno en verano
UÑAS	Negras

Observaciones

En las hembras, los dibujos punteados son más grandes y más agrupados sobre el vientre.

El pico, a causa de la condición, se colorea hacia el amarillo (pasando del color del invierno hacia el color del verano): esto no significa que sea defectuoso.

Defectos clásicos del estornino pinto en los machos y en las hembras

- Dibujos demasiados groseros sobre el pecho
- Dibujos de las sus-caudales incompletos

- Los ribetes de las coberteras irregulares
- Reparto irregular del dibujo punteado
- Pecho angulado

Diámetro máximo de la anilla: 4,5 mm



GORRIÓN ALPINO

(*Montifringilia nivalis*)



Características del macho

PICO	Cónico, bastante robusto y puntiagudo, amarillo en la base y negruzco en la punta; el pico se vuelve negro completamente en verano
OJOS	Negros
CABEZA	Casquete craneal, nuca y mejillas gris-pizarra; lore gris-negrusco; babero negruzco, más visible en verano que en invierno, cubriendo el mentón y rodeándolo en todo su contorno inferior; el babero está separado del gris de la cabeza por un bigote oblicuo de color gris claro, que une el dibujo de la mejilla y se funde en el color del pecho
ESPALDA	Bruno oscuro cortado netamente sobre gris oscuro de la nuca; el contorno de cada pluma dorsal es más claro que el centro, esto hace que dibuje un escamado muy regular de la totalidad del manto
PECHO	Del mismo color gris claro limpio que la base de las mejillas, adelantándose y aclarándose hacia el vientre
FLANCOS	Gris uniforme como el pecho, más claro a la inmediatez de la cola
VIENTRE	Blanco sucio hasta en la parte anal
ALAS	Coberteras y rémiges secundarias blanco sucio, determinando un ancho margen blanco sobre el ala; rémiges primarias negras sobre 3/4 de su longitud terminal y blanca en la base; rémiges bastardas negras, esto hace que dibuje un pequeño lunar blanco; las rémiges secundarias internas llevan una marca bruna oscura con ribete más claro; las alas son bastante largas y recubren la cola justo los dos tercios
OBISPILLO	Negrusco
COLA	Las dos rectrices centrales son brunáceas en los sujetos del primer año y negras en los sujetos adultos; las demás son blancas con la extremidad negra sobre 1 cm; la cola es de largo mediano y ligeramente sesgada
PATAS, DEDOS Y UÑAS	Color negro
FORMA GENERAL	De aspecto robusto sin ser grosero, las alas largas y los colores muy contrastados

Características de la hembra

No tiene dimorfismo marcado entre ambos sexos. El babero de la hembra sin embargo está muy ligeramente marcado.

Defectos clásicos de los gorriones alpinos machos y hembras

- Falta de nitidez en el escamado dorsal
- Babero totalmente inexistente (sujeto con plumaje de la primera muda)
- Dibujo mal delimitado
- Alas cruzadas o caídas

Diámetro máximo de la anilla: 3 mm

GORRIÓN CHILLÓN

(*Petronia petronia*)



Características del macho y de la hembra

PICO	Color cuerno oscuro en la mandíbula superior; ocre amarillo en la mandíbula inferior; cónico, robusto y muy oscuro en la extremidad de la mandíbula superior
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Aplanada; aspecto ancho; cima del cráneo gris-beige claro, delimitada en ambos lados por una banda longitudinal gris-bruno oscuro que se estira hacia la nuca; las dos barras se reúnen sobre la frente, cejas y bigotes gris-beige muy claro; dibujo de mejillas gris-bruno
ESPALDA	Fondo gris-beige marcado de un escamado muy nítido gris-bruno oscuro
GARGANTA	Gris-beige claro, remarcado en la base por una mancha oblonga amarilla más o menos neta
PECHO	Gris-beige, ligeramente escamado
FLANCOS	Gris-beige marcado de un escamado más oscuro
VIENTRE	Beige-claro; zona anal marcada de bruno
ALAS	Rémiges y coberteras primarias marcadas de bruno-negruczo ribeteado de beige; las rémiges secundarias externas están marcadas de beige muy claro en la extremidad; grandes coberteras largamente ribeteadas de beige muy claro
OBISPILLO	Beige claro estriado de bruno
COLA	Bastante corta: rectrices bruno-negruczas ribeteadas de gris-beige y bordeadas de blancuzco a la extremidad
PATAS Y DEDOS	Bruno-oscuro
UÑAS	Gris-negro
FORMA GENERAL	Robusto y rechoncho

Defectos clásicos del gorrión chillón macho y hembra

- Falta de limpieza en el dibujo
- Mancha amarilla de la garganta ausente

Diámetro máximo de la anilla: 3 mm

GORRIÓN COMÚN

(PASSER DOMESTICUS)



Características del macho

PICO	Bruno grisáceo con la raíz amarillenta en invierno, negro en verano
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Lore negro; frente, corona y nuca gris-azulado; la región bajo el ojo, el mentón, la garganta y la mitad de lo alto del pecho negra; mejillas y región parótida gris blancuzcas; a partir del ojo, una zona marrón va alargándose sobre la nuca, pequeño punto blanco arriba del ojo
ESPALDA	Manto bruno-marrón estriado de negro; el bajo de la espalda es blanco-grisáceo
PECHO	Blancuzco
FLANCOS	Blanco-grisáceo teñido de un tinte isabela
ALAS Y HOMBROS	Escapulares brunas ralladas de negro con un borde blanco-grisáceo formando un dibujo sobre los hombros; rémiges primarias bruno-negro con un ribete rojizo a lo largo de la orilla externa; pequeñas coberteras alares marrón vivo; coberteras medianas bruno-negro terminadas por un borde blancuzco que forman una banda alar; grandes coberteras bruno-negro con un largo borde bermellón el largo de la orilla externa y terminadas por un borde blanco
OBISPILLO	Gris brunáceo
COLA	Rectrices bruno negro con un ribete grisáceo a lo largo de la orilla externa; sub-caudales rojizo amarronado
PATAS Y DEDOS	Bruno claro
UÑAS	Negras

Características de la hembra




PICO	De color córnea
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Bruno con los trazos debajo de las cejas amarillo-bruno que comienzan en la base del

	pico y se terminan en la región parótida
ESPALDA	De un bruno dominante con estrías negro-bruno
GARGANTA	No tiene babero ni pecho negro como el macho pero es de color gris-brunáceo
PECHO	Gris-bruno
FLANCOS	Gris-bruno un poco más oscuro que el macho
VIENTRE	Gris-bruno
ALAS Y HOMBROS	Como el macho pero el borde de las rémiges son de un bruno más pálido; banda alar típica; hombros gris-bruno
OBISPILLO	Bruno
COLA	Como el macho pero los bordes de las rectrices son de un bruno más pálido
PATAS Y DEDOS	Bruno claro
UÑAS	Negras

Defectos clásicos del gorrión común en los machos y hembras

- Líneas oculares mal definidas sobre todo en las hembras
- Babero y dibujos del pecho irregulares
- Flancos demasiado claros por continuación del pecho
- Barras alares irregulares
- Dibujo de la espalda irregular

Diámetro máximo de la anilla: 3 mm



GORRIÓN COMÚN (Mutación Bruna)



Características del macho

PICO	En invierno: de color carne teñido de amarillo en la base pico; en verano: de color más brunáceo, pero jamás negro
OJOS	Bruno oscuro
CABEZA	Frente, corona y nuca bruno-beige; lore bruno oscuro; un trazo de un color bruno-rojizo parte detrás de los ojos y se alarga sobre la nuca; pequeño punto blanco detrás de los ojos; mejillas y región parótidas de color crema
ESPALDA	El color de fondo del manto es bruno vivo con reflejos bruno-rojizos y estriado de bruno muy oscuro
GARGANTA	En verano: babero bruno oscuro del mentón al pecho; en invierno: mentón, garganta y una parte del pecho bruno oscuro; el dibujo no es lo mismo de neto que en verano, pero esto no se debe de considerar como falta
PECHO Y FLANCOS	Crema oscuro
HOMBROS	Escapulares bruno-rojo estriado de bruno rojo oscuro con los bordes bruno-claros
ALAS	Las rémiges primarias de un color bruno oscuro con un ribete bruno claro a lo largo de la orilla externa; pequeñas coberteras alares de un color bruno-rojizo; coberteras medianas de color bruno-oscuro con un ribete bruno claro; grandes coberteras de un color bruno oscuro con un borde rojizo y terminadas por un borde bruno claro; este borde más claro constituye una banda alar; otra banda alar blancuzca se encuentra entre las medianas y las grandes coberteras
OBISPILLO	Bruno-beige
COLA	Rectrices de un bruno vivo con un ribete bruno claro a lo largo de toda la orilla externa

PATAS Y DEDOS	De un color carne con un tinte amarillento
UÑAS	De color carne

Características de la hembra

PICO	De color carne teñido de amarillo en la base
OJOS	Brunos oscuros
CABEZA	Frente, corona y nuca de color bruno vivo; trazo superciliar de color crema y bien regularizados; lore de color crema; mejillas de color bruno claro
ESPALDA	Bruno vivo estriado de bruno oscuro
GARGANTA Y PECHO	De color bruno amarillento vivo; el color debe de ser muy regular
VIENTRE Y FLANCOS	Muy regulares
ALAS	Rémiges de color bruno-oscuro con un ribete más claro; la barra alar, coberteras mayores y las grandes coberteras son de un color crema claro; la extremidad de las grandes coberteras forman una barra alar de un bruno más claro
OBISPILLO Y COLA	De color bruno vivo
PATAS Y DEDOS	De color carne
UÑAS	De color carne oscura

Defectos clásicos del gorrión común bruno, machos y hembras

- Color desigual
- Barras alares irregulares
- Diseño dorsal poco marcado
- Los trazos de las cejas poco nítidos en las hembras

GORRIÓN COMÚN (Mutación Ágata)

Características del macho

PICO	En invierno: carne oscura con la base amarillenta; en verano: negro
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Frente, corona y nuca de color gris-bruno ligero; trazos de debajo de las cejas y nuca bruno-rojo; los pequeños puntos arriba del ojo deben de ser bien visibles; lore negro y mejillas gris-beige
ESPALDA	Bruno-beige estriado de bruno-negro
GARGANTA	Babero típico de color negro
PECHO, FLANCOS Y VIENTRE	Gris-beige
ALAS	Rémiges de color beige con un ligero ribete de color bruno-avellana; pequeñas coberteras color bruno-avellana; coberteras medianas de color beige con la extremidad blanca: esto forma una banda alar; grandes coberteras bruno-beige con un ribete beige-claro
OBISPILLO	Beige
COLA	Beige con un ribete beige claro
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color carne

Características de las hembras

PICO	De color carne y amarillo en la base
OJOS	Bruno-negro
CABEZA	Gris-bruno oscuro con los trazos de las cejas bruno-beige claro
ESPALDA	Bruno beige estriado de bruno negro
GARGANTA Y PECHO	Beige-claro con un tinte marfil
VIENTRE Y FLANCOS	Beige-claro con un tinte marfil
ALAS	Rémiges beige; pequeñas coberteras bruno claro; coberteras medianas bruno oscuro terminadas por un borde blanco sucio; esto forma la banda alar; grandes coberteras bruno oscuro con un ribete beige claro
OBISPILLO	Beige
COLA	Rectrices beige con un ribete beige claro
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color carne

Defectos clásicos del gorrión común ágata en machos y hembras

- Color jaspeado sobre el pecho
- Rémiges demasiado oscuras
- Trazos de las cejas irregulares
- Flancos demasiado claros por continuación del pecho
- Banda alar irregular
- Dibujo dorsal irregular

NOTA: La mutación ágata parece más fuerte que la forma salvaje porque la melanina está más reducida, pero el color del fondo está formado por carotenoides bastantes sombríos, excepto los trazos superciliares y la nuca del macho. Este color de fondo está menos enmascarado en el ágata por la melanina reducida, pero no es muy intenso, ello no se manifiesta mucho salvo en los trazos superciliares y la nuca del macho.

Por contra en los pájaros como el verderón y el lugano, que presentan unos carotenos muy intensos amarillos, el color del fondo debe de ser muy visible en la mutación ágata lo que por ello está menos enmascarado por la melanina reducida de la mutación ágata.

GORRIÓN COMÚN (Mutación Phaeo)



Características del macho

PICO	De color carne, puede mostrar un ensombrecido en la base del pico
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Frente, vertex y occipucio de color beige claro; trazos oculares bruno-marrón partiendo del ojo y alargándose sobre la nuca; lore de color bruno-claro; mejillas y región parótidas blanco sucio con un ligero tinte bruno
ESPALDA	Blanco sucio con el dibujo phaeo (ribete bruno de forma de escamas) visible sobre todo la espalda
GARGANTA	El dibujo típico de gorrión debe de estar visible en bruno claro
PECHO	Blanco sucio
FLANCOS	Blanco sucio con un tinte bruno claro visible
ALAS	Rémiges primarias con un ribete bruno-marrón bien larga; rémiges secundarias de un blanco sucio con un ribete bruno-marrón más estrecho; pequeñas coberteras alares bruno-marrón; las coberteras alares medianas son de un blanco sucio con un ribete bruno marrón; las grandes coberteras alares son de un blanco sucio con un ribete bruno marrón; la banda alar es blanca sucia y debe de ser visible entre las medianas y las grandes coberteras
OBISPILLO	Beige-claro con un ribete bruno-marrón
COLA	Blanco sucio con un ribete bruno-marrón visible en todas las rectrices
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color carne

Características de las hembras

PICO	De color carne; puede mostrar un gallardete oscuro en la base del pico
OJOS	Castaño oscuro

CABEZA	Frente, vertex y occipucio de un color blanco sucio con un viso bruno; trazos superciliares y nuca de un bruno sucio; lore de un bruno sucio mejillas y región parótidas de un bruno sucio
GARGANTA, FLANCOS Y PECHO	De un color bruno y bien igualado
VIENTRE	Un poco más claro que el macho
ALAS	Tiene las mismas características que el macho pero los ribetes son de un bruno vivo
OBISPILLO	Bruno vivo con un ribete más oscuro
COLA	Blanco sucio con un ribete bruno sucio visible sobre todas las rectrices
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color carne

Defectos clásicos del gorrión común phaeo machos y hembras

- Falta de dibujo phaeo sobre todo en los machos
- Dibujo de la casquete del macho irregular
- Trazos oculares
- Rémiges y rectrices sin ribetes brunos
- Babero demasiado gris

GORRIÓN COMÚN (Mutación Blanca)

Características del macho y la hembra

PICO	De color carne
OJOS	Negros
CUERPO	Blanco
ALAS Y COLA	Blanco
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color carne

Defectos clásicos del gorrión común blanco macho y hembra

- Color impuro

GORRIÓN COMÚN (Mutación Albina)

Características del macho y de la hembra

PICO	De color carne
OJOS	Rojos
CABEZA	Blanca
ESPALDA	Blanca
GARGANTA	Blanca
PECHO	Blanco
FLANCOS	Blancos
VIENTRE	Blanco
ALAS	Blancas
OBISPILLO	Blanco
COLA	Blanca
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color carne

Defectos clásicos del gorrión común albino machos y hembras

- Color impuro
- Desnudo en la región auricular

GORRIÓN COMÚN (Mutación Lutina Marfil)

Características del macho y de la hembra



PICO	De color carne.
OJOS	Rojos
CABEZA, ESPALDA, GARGANTA, PECHO, FLANCOS, VIENTRE, ALAS, OBISPILLO Y COLA	Amarillo marfil
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color carne

Observaciones

En los machos; el color amarillo marfil es más intenso que en las hembras.

Defectos clásicos de los gorriones comunes lutino marfil en machos y hembras

- Color impuro
- Color mal repartido

GORRIÓN COMÚN (Mutación Satiné)

Características del macho

PICO	De color carne
OJOS	Rojos
CABEZA	Trazos superciliares bruno-rojo claro mejillas marfiles; corona blanco sucio
ESPALDA	Color de fondo marfil con un dibujo dorsal bruno-beige claro; el dibujo debe de ser visible
GARGANTA	Babero bruno claro
PECHO, FLANCOS Y VIENTRE	Marfiles
ALAS	Pequeñas coberteras bruno-beige claro; coberteras medianas blancas formando la banda alar; grandes coberteras marfiles; rémiges primarias y secundarias marfiles
OBISPILLO Y COLA	Marfil
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color carne

Características de la hembra

PICO	De color carne
OJOS	Rojos
CABEZA	Blanco sucio con un ligero dibujo punteado bruno claro (dibujo satiné típico); mejillas marfiles; trazos superciliares visibles y más claros
ESPALDA	Color de fondo marfil con un dibujo estriado bruno-beige claro típico y bien visible
GARGANTA, PECHO, FLANCOS Y VIENTRE	Marfiles
ALAS	Pequeñas coberteras beige; medianas coberteras beige con un ribete marfil;

grandes coberteras beige con un ribete marfil; rémiges primarias y secundarias beige claro con un ribete marfil

OBISPILLO

Marfil

COLA

Beige claro con un ribete marfil

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne

Defectos clásicos del gorrión común satiné macho y hembra

- Trazos superciliares, irregulares o de colores defectuosos
- Dibujo dorsal muy débil o poco visible

GORRIÓN COMÚN (Mutación Opal)

Características del macho



PICO	En invierno de color carne oscura. En verano negro-azulado
OJOS	Negros
CABEZA	Frente, corona y nuca gris-plateado; un trazo superciliar gris-azul mostrando al menos un poco de bruno-avellana; lore gris-azul
ESPALDA	Gris-plateado estriado de gris-azul
GARGANTA	Gris-plateado con el dibujo gris-azul típico del opal
PECHO Y VIENTRE	Gris-plateado
ALAS	Gris-plateado estriado de gris azul; un ligero velo bruno-avellana es al menos visible en los ribetes
OBISPILLO	Gris-plateado
COLA	Gris-plateado con un ribete gris-azul
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color carne oscura

Características de la hembra

PICO	En invierno: color carne oscura. En verano: negro-grisáceo
OJOS	Negros
CABEZA	Gris-azul; trazos superciliares gris claro con un tinte beige; lore gris-azul oscuro
ESPALDA	Gris-plateada estriada de gris azul
GARGANTA Y VIENTRE	Gris-plateado
PECHO	Gris-plateado
ALAS	Gris-azul claro con un ribete beige claro sobre las coberteras dejando también ver las características típicas del dibujo del ala
OBISPILLO	Gris-plateado
COLA	Gris-plateado
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color carne oscura

Defectos clásicos del gorrión común opal en machos y hembras

- Color irregular
- Color característico del opal demasiado pálido o no visible
- Mal emplumado sobre todo detrás de los ojos
- Demasiado pequeño de talla

GORRIÓN ITALIANO

(*Passer italiae*)

Características del macho

PICO	Bruno-negruczo, más oscuro en verano; cónico y solido
OJOS	Negros
CABEZA	Robusta, cráneo bastante plano, zona loral negra, superpuesta de una fina ceja blanca; frente, casquete y nuca enteramente chocolate y mejillas blanquecinas
GARGANTA	Largo babero negro cubriendo toda la garganta. El babero es menos intenso en invierno
PECHO	Parte superior negro difuminándose sobre la base; base del pecho gris-blancuzco
FLANCOS	Gris-blancuzco
VIENTRE	Gris-blancuzco
ESPALDA	Bruno fuertemente estriado de negro
OBISPILLO	Gris-beige
ALAS	Rémiges primarias bruno-negro ribeteadas de rojizo-bermellón sobre la orilla externa; rémiges secundarias más rosadas; coberteras primarias bruno-negro con largo ribete rojizo-bermellón; grandes coberteras negruzcas largamente bordeadas de blanco que forman una neta barra alar; espalda rojizo-bermellón
COLA	Rectrices bruno negro ribeteadas de bruno-grisáceo
PATAS Y DEDOS	Gris-bruno
UÑAS	Oscuras
FORMA GENERAL	Robusto y elegante

Características de las hembras

La hembra es semejante a la del gorrión común.

Defectos clásicos del gorrión italiano en macho y hembra

- Línea ocular sin nitidez
- Estrías dorsales irregulares
- Barra alar difusa
- Babero irregular o difuminado en los machos

Diámetro máximo de la anilla: 3 mm

GORRIÓN MOLINERO

(*Passer montanus*)

Características del macho y de la hembra



PICO	En invierno: castaño oscuro con la base del pico amarillenta; en verano: negro
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Dibujo de la cabeza y la nuca son castaño chocolate; los lados de la cabeza y del cuello son blancos con una mancha negra sobre las mejillas; lore, raya debajo del ojo y mentón, todos ellos son negros
ESPALDA	Alto de la espalda castaño rayado de negro, bajo bruno-gris
PECHO	El alto del pecho es grisáceo; el bajo es blancuzco
FLANCOS	Los flancos y las subcaudales de color bruno
ALAS	Hombros de color bruno; rémiges primarias y secundarias de color bruno-negro ribeteadas de rojo-bermejo; las grandes coberteras alares son negras con un borde bruno-amarillento a lo largo de la orilla externa y el extremo blancuzco, las coberteras medianas son negras con puntos blancuzcos; las pequeñas coberteras son de un rojo, bermejo-marrón
OBISPILLO	Bruno-gris
COLA	Rectrices bruno-oscuro ribeteadas de bruno-amarillento; subcaudales bruno-bermejo
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color córnea

Defectos clásicos del gorrión molinero macho y hembra

- Mancha de las mejillas irregulares
- Barras alares irregulares
- El dibujo del casquete no llega a la nuca
- Mentón y babero irregulares
- Dibujo dorsal irregular

Nota: La hibridación con el gorrión común puede ser posible, depende del aspecto y talla de ciertos sujetos.

Diámetro máximo de la anilla: 2,9 mm

GORRIÓN MOLINERO (Mutación Bruna)

Características del macho y de la hembra

PICO	Bruno y amarillo en la base
OJOS	Castaños oscuros
CABEZA	Frente, corona y nuca color avellana claro; mejillas blancas con una mancha castaño oscuro en el medio; lore bruno oscuro
ESPALDA	Bruno-amarillo vivo estriado de bruno oscuro
GARGANTA	Blanca con un babero, o barbilla bruno oscuro
PECHO	De color isabela
FLANCOS	Bruno amarillo vivo
VIENTRE	Blanco
ALAS	Rémiges bruno-amarillo; pequeñas coberteras bruno-avellana claro; coberteras mayores bruno-amarillo vivo con un borde blanco en la extremidad: esto hace que forme una banda alar; grandes coberteras bruno-amarillo con un ribete isabela
OBISPILLO	Bruno-amarillo vivo
COLA	Bruno-amarillo vivo
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color carne

Defectos clásicos del gorrión molinero bruno en machos y hembras

- Dibujos característicos ausentes a causa de un color demasiado pálido
- Demasiado pequeño de talla
- Manchas de las mejillas irregulares
- Barras alares irregulares
- Mancha bruna de la cabeza mal delimitada sobre la nuca
- Mancha del mentón irregular o corrida
- Color de los flancos demasiado pálido a consecuencia de la continuación del pecho
- Dibujo de las estrías dorsales irregulares o discontinuas

GORRIÓN MOLINERO (Mutación Opal)

Características del macho y de la hembra

PICO	Gris azulado con amarillo en la base
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Frente, corona y nuca de color gris-azulado; mejillas gris-plateado con una mancha gris-azulada; mejillas gris-plateadas; con una mancha gris-azulado
ESPALDA	Gris-plateado estriado de gris-azul
GARGANTA	Gris plateado con una barbilla gris-azul
PECHO	Gris-plateado
FLANCOS	Gris-plateado
VIENTRE	Blanco sucio
ALAS	Rémiges gris-plateado; pequeñas coberteras gris-azul; coberteras medianas gris plateado con la extremidad blanca que forman una banda alar; grandes coberteras gris plateado
OBISPILLO	Gris-plateado
COLA	Gris plateado
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color carne oscura

Defectos clásicos de los gorriones molineros opal, machos y hembras

- Características típicas del opal atenuadas por un color demasiado pálido
- Demasiado pequeño de talla
- Mancha de las mejillas irregulares
- Bandas alares irregulares
- Mancha de la cabeza mal delimitada en la nuca
- Mancha del mentón irregular o corrida
- Color de los flancos demasiado pálidos por continuación del pecho
- Dibujo estriado de la espalda estriado o discontinuo

GORRIÓN MORUNO

(*Passer hispaniolensis*)

Características del macho



PICO	Bruno-grisáceo con la base amarillenta en invierno, negro en verano, cónico y robusto
OJOS	Negros
CABEZA	Bastante poderosa y plana, de aspecto ancho; ancho trazo loreal negro afinándose detrás del ojo; fina ceja blanca; frente, cúspide del cráneo y nuca enteramente bruno-bermellón; el dibujo de la nuca se ensancha en la base, y detrás de las mejillas; las mejillas son blanco luminoso ligeramente sombreadas de gris
ESPALDA	Enteramente escamado de negro sobre fondo gris-beige claro
GARGANTA	Enteramente negro uniforme
PECHO	Negro liso que se degrada en escamas negras hacia la base; la extensión del negro del pecho es variable
FLANCOS	Enteramente marcado de anchas escamas negras sobre fondo gris-blanco
VIENTRE	Gris-blancuzco
ALAS	Rémiges gris-negro ribeteadas de bruno, el ribete de las rémiges secundarias es más ancho; coberteras rojizo-bermellón ribeteadas de blanco con el borde más ancho para las primarias, esto hace que dibuje dos barras alares
OBISPILLO	Gris oscuro
COLA	Rectrices gris-negra bordeadas de bruno
PATAS Y DEDOS	Gris-bruno oscuro
UÑAS	Gris-negro

FORMA GENERAL

Un poco más esbelto que el gorrión común; robusto y elegante

Características de la hembra

La hembra se asemeja a la del gorrión común con un escamado más neto y más oscuro sobre la espalda, las estrías de los flancos y una trazo loral más marcado.


Defectos clásicos del gorrión moruno machos y hembras

- Líneas oculares poco nítidas
- Falta de limpieza y de regularidad en el escamado
- Dibujo mal delimitado
- Falda de claridad y de contraste en el color del macho

Diámetro máximo de la anilla: 3 mm

GRAJA

(*Corvus frugilegus*)



Características del macho y de la hembra

PICO	Negro; el pico es más derecho y más afilado que en la corneja negra; tiene la base del pico descarnado (gris-blancuzco); la base del pico se descarna gradualmente hacia el segundo año, por consiguiente, en plumaje juvenil el grajo no tiene la base del pico descarnado
OJOS	Negros
PLUMAJE DEL CUERPO	Enteramente negro con reflejos violáceos, una característica típica de la graja es el trasero (plumaje flojo a los muslos) N.B. no penalizar
ALAS	Rémiges primarias son negras, así como las secundarias las dos con reflejos violáceos
COLA	Las rectrices son negras y la forma de la cola es redondeada
PATAS, DEDOS Y UÑAS	Negros

Observaciones

Atención a la composición del ala de los córvidos. La primera rémige mide la mitad que la segunda; la segunda rémige mide las tres cuartas partes que la primera; la tercera y la cuarta rémige primaria son las dos más largas. Luego en el enjuiciamiento de los córvidos, hay que tener en cuenta estas características y no escribir nunca "rémiges demasiado cortas o en crecimiento".

Defectos clásicos de la graja en machos y hembras

- Falta de lustre
- Trasero irregular.

Diámetro máximo de la anilla: 7,2 mm

GRAJILLA

(Corvus monedula)



Características del macho y de la hembra

PICO	Negro con pelos eréctiles negros
OJOS	Gris-azul con la pupila negra
CORONA	Negra
NUCA Y MEJILLAS	Gris-plateado, aclarándose hacia el manto
ESPALDA	Negra con reflejos azulados
MANTO Y OBISPILLO	Negros con reflejos metálicos
COBERTERAS ALARES	Negras con reflejos metálicos
SUS-CAUDALES	Negras con reflejos metálicos
GARGANTA Y MENTÓN	Negra
VIENTRE Y FLANCOS	Negra
ALAS	Negras con un reflejo azulado
COLA	Negra
PATAS, DEDOS Y UÑAS	Negras

Observaciones

La extremidad de las alas casi toca la extremidad de la cola; las tres primeras rémiges primarias son gradualmente más cortas que las siguientes.

Defectos clásicos de la grajilla en machos y hembras

- Color del cuello no demasiado nítido y no demasiado gris
- Casquete irregular

Diámetro máximo de la anilla: 6 m

JILGUERO (*Carduelis carduelis*)



Características del macho

PICO	Color carne, con la extremidad negra; forma afilada
OJOS	Castaños oscuros
CABEZA	Máscara rojo escarlata englobando la frente, el mentón y la mitad de las mejillas hasta el ojo; detrás de la máscara, una mancha blanca parte de los lados de la cabeza y va hasta la garganta; el casquete, nuca y la parte de detrás de las mejillas negras; lore negro; la forma de la máscara puede ser redonda o cuadrada. Observaciones: Las mejillas son blancas pero hay que tener en cuenta las razas, o sus-especies según la situación geográfica, los jilgueros británicos o el español tienen las mejillas mucho más brunas que los nórdicos
CUELLO	Collar blanco en la nuca separando el negro de la nuca con el bruno del manto
ESPALDA	Bruno-gamuza uniforme
HOMBROS	Negros
PECHO	Barra pectoral bruna marcando un champiñón blanco en el centro
FLANCOS	Brunáceos aclarándose hacia el vientre
VIENTRE	Blanco
ALAS	Negras con una ancha barra alar de un amarillo vivo; puntos blancos en forma de gotas de agua en las puntas de cada rémige
OBISPILLO	Blancuzco
COLA	Negra con puntos blancos en la extremidad de las rectrices; una gran mancha blanca en la parte inferior de las rectrices externas (habas), (lunas)
PATAS Y DEDOS	Son de color carne, más oscuro se tolera
UÑAS	Oscuras

Características de la hembra

Tiene las mismas características que los machos, las coberteras de los hombros son de un bruno verdoso.

Defectos clásicos de los jilgueros machos y hembras

- Dibujo de la máscara irregular
- Color de la máscara irregular; puntos negros o blancos sobre la máscara
- Máscara bicolor
- Casquete negro irregular
- Banda alar irregular
- Champiñón irregular
- Dibujos de las alas o de la cola no simétricos o incompletos

Diámetro máximo de la anilla:

- 2,4 mm pequeña variedad
- 2,6 mm mediana variedad
- 2,8 mm gran variedad



LUGANO

(*Carduelis spinus*)

Características del macho



PICO	Fino, puntiagudo y de color córneo claro; llameado de negro
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	La frente, la parte superior del cráneo y el occipucio son negras; el casquete es negro ligeramente punteado de gris; las mejillas y la región auricular son de color amarillo-grisáceo ligeramente velado; los trazos superciliares amarillentos parten detrás del ojo y ensanchándose sobre el cuello, pasando detrás el dibujo de las mejillas.
	Observaciones: Los jóvenes pájaros pueden mostrar ligeros lunares
CUELLO	Nuca de color verdoso con finas estrías muy oscuras
ESPALDA	Manto del mismo color que la nuca
HOMBROS	Escapulares del mismo color que la nuca
PECHO Y GARGANTA	De color verde-amarillento; ciertos machos tienen un pequeño babero negro sobre lo alto de la garganta; ésta debe de ser pequeña y regular y no es en ningún concepto obligatoria
FLANCOS	De color gris-verdoso con estrías negras que deben de estar bien señaladas en ambos lados del cuerpo
VIENTRE	Región anal ligeramente grisácea
ALAS	Las grandes rémiges son negruzcas con la orilla externa amarilla a partir de la tercera, esto hace que forme un pequeño espejo o lunar amarillo a la base; las rémiges secundarias están bordeadas de un color grisáceo a la extremidad; una barra alar amarilla está formada por el ribete de las coberteras primarias
OBISPILLO	Amarillo-verdoso
COLA	Los dos primeros tercios de las rectrices son amarillos mientras que la extremidad de las rectrices es negra; las dos rectrices medianas son negras sobre toda su longitud
PATAS	Color carne oscura
DEDOS	Color carne oscura

UÑAS

Negros

Características de la hembra



PICO	Fino, puntiagudo y de color cuerno claro; flameado de negro
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	La frente, la parte superior del cráneo y el occipucio son grisáceos con finas estriás entrecortadas; los trazos superciliares son también menos amarillos que en los machos pero más bien de color gris-verdoso; las mejillas y la región auricular son brunáceas veladas de amarillo
CUELLO, ESPALDA Y HOMBROS	El color grisáceo está finamente estriado de brunáceo-negro
PECHO, GARGANTA Y FLANCOS	El color es grisáceo en el conjunto; los lados del pecho y sobretudo los flancos deben de tener un buen dibujo estriado, bien regularizado, neto y de color gris oscuro
VIENTRE	Gris-blancuzco
ALAS	De color gris oscuro con las mismas marcas que los machos, pero de un amarillo menos sostenido
OBISPILLO	Amarillo-verdoso ligeramente estriado de gris oscuro
COLA	El primer tercio de las rectrices es amarillo, el resto es gris negro; las dos rectrices medianas son gris-negro
SUS CAUDALES	Presenta un dibujo escamado
PATAS	Color carne oscura
DEDOS	Color carne oscura
UÑAS	Negras

Observaciones

Las hembras deben de tener un color de fondo lo más gris posible.


Defectos clásicos del lugano macho y hembra

- Anteojos: dos pequeñas manchas amarillas en el macho o gris en la hembra sobre la frente
- Trazos superciliares que sobrepasan el ojo en dirección a la frente
- Trazos superciliares muy largos
- Babero irreguBarras alares irregulares
- Ausencia del pequeño espejo alar
- Estriás irregulares
- Color de fondo excesivamente amarillo en las hembras

Diámetro máximo de la anilla: 2,5 mm

LUGANO (Mutación Bruna)

Características del macho



PICO	Color cuerno en la base con la extremidad de la mandíbula superior negro-bruno
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Frente, occipucio y parte superior del cráneo bruno muy oscuro; el color del casquete está matizado y punteado de beige; las mejillas son de color amarillo-verdoso lavadas de bruno; los trazos superciliares son amarillos
ESPALDA	Manto de color verdoso estriado de bruno con un viso bruno claro sobre toda la espalda
GARGANTA	Babero de color bruno oscuro si éste está presente
PECHO	Color verdoso lavado de beige
FLANCOS	Color de fondo blanco-amarillento con estrías brunas oscuras
VIENTRE	Beige cremoso
ALAS	Grandes rémiges brunas oscuras con un ribete amarillo el largo de la orilla externa partir de la tercera de las rémiges secundarias tienen un ribete amarillento; barra alar de color gamuza y lunar o espejo amarillo pálido; hombros amarillo-verdoso cuando son visibles
OBISPILLO	Amarillo-verdoso
COLA	Los dos primeros tercios de las rectrices son amarillos con el último tercio que es muy oscuro salvo las dos rectrices medianas que son enteramente brunas y muy oscuras
PATAS	Brunas
DEDOS	Brunos
UÑAS	Oscuras

Características de la hembra

PICO	Color cuerno en la base con la extremidad de la mandíbula superior negro-bruno
OJOS	Bruno oscuro
CABEZA	Frente, occipucio y parte superior del cráneo bruno-verdoso estriado de bruno oscuro; mejillas grisáceas lavadas de bruno; los trazos superciliares son de color amarillento
ESPALDA	Manto verdoso lavado de bruno bastante oscuro y estriado de bruno oscuro
PECHO	Blanco sucio estriado de bruno
FLANCOS	Color de fondo beige con estrías brunas oscuras
VIENTRE	Beige cremoso
OBISPILLO	Amarillo verdoso ligeramente estriado de bruno
COLA	El primer tercio de las rectrices es amarillo y los dos tercios restantes son de un color bruno oscuro salvo las dos rectrices medianas que son enteramente brunas y muy oscuras
PATAS	Brunas
DEDOS	Brunos
UÑAS	Oscuras

Defectos clásicos del lugano bruno macho y hembra

- Anteojos: dos pequeñas manchas amarillas en el macho o grises en la hembra sobre la frente
- Trazos superciliares que sobrepasan el ojo en dirección a la frente
- Trazos superciliares demasiado largos
- Babero irregular
- Barras alares irregulares
- Ausencia del pequeño lunar o espejo
- Estrías de los flancos irregulares

LUGANO (Mutación Ágata)

Características del macho

PICO	Color carne ahumada
OJOS	Negros
CABEZA	Frente, parte superior del cráneo y occipucio de color gris oscuro; matiz de color en el casquete que está punteado de gris; mejillas y región auricular de color verde escarchado de gris, trazos superciliares de color amarillo
ESPALDA	Manto verdoso empañado de gris con estrías negras
PECHO	Color verde amarillento
GARGANTA	Babero de color gris oscuro si éste está presente
FLANCOS	Color de fondo verde-amarillento con estrías grises muy oscuras
VIENTRE	Blanco grisáceo
ALAS	Grandes rémiges gris oscuras con los bordes externos orillados de amarillo a partir de la tercera; la orilla de las rémiges secundarias es de color grisáceo; barra alar amarillo claro igual que el lunar o espejo
OBISPILLO	Verdoso
COLA	Los dos primeros tercios de las rectrices son amarillos y el último es gris muy oscuro, salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris oscuras
PATAS	Carne oscura
DEDOS	Carne oscura
UÑAS	Oscuras

Características de la hembra

PICO	De color carne quemada
OJOS	Negros
CABEZA	Frente, parte superior del cráneo y occipucio gris claro estriado de negro; mejillas y región auricular grisáceas; trazos superciliares de color gris claro

ESPALDA	Manto grisáceo estriado de negro diluido
PECHO	Gris claro estriado de negro diluido
FLANCOS	Color de fondo gris claro estriados de un gris muy oscuro
VIENTRE	Blanco grisáceo
ALAS	De color idéntico al del macho, el amarillo es menos luminoso
OBISPILLO	Grisáceo ligeramente estriado de gris oscuro
COLA	El primer tercio de las rectrices es amarillo y los dos tercios restantes son gris muy oscuro salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris muy oscuro
PATAS	Carne oscura
DEDOS	Carne oscura
UÑAS	Oscuras

Defectos clásicos del lugano ágata macho y hembra

- Anteojos: dos pequeñas manchas amarillas en el macho o grises en la hembra sobre la frente
- Trazos superciliares que sobrepasan el ojo en dirección a la frente
- Trazos superciliares demasiado largos
- Babero irregular
- Barras alares irregulares
- Ausencia del pequeño lunar o espejo
- Estrías de los flancos irregulares

LUGANO (Mutación Verde Diluido)

Características del macho



PICO	Brunáceo, flameado de negro en la extremidad de la mandíbula superior
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Frente, parte superior del cráneo y occipucio gris muy oscuro empañada de verde; trazos oculares amarillos, mejillas verduscas empañadas de gris
ESPALDA	Verde estriado de gris oscuro
PECHO	Verde amarillento pudiendo estar empañado de gris claro
GARGANTA	Babero gris oscuro si éste existe
FLANCOS	Gris claro detrás; gris claro empañado de verdoso delante y estriado de gris oscuro
VIENTRE	Blanco grisáceo
ALAS	Todas las rémiges tienen un color diluido gris verdusco con el borde de la orilla externa amarillenta a partir de la tercera; las coberteras primaria y secundaria están terminadas por un color verde claro muy luminoso que hacen una banda alar verde y hombros verdes; lunar o espejo amarillo pálido
OBISPILLO	Amarillo verdoso ligeramente estriado de gris
COLA	Los dos primeros tercios de las rectrices son amarillos y el último tercio gris verdoso salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris verdoso; subcaudales amarillo-verdoso estriado de gris
PATAS	Carne oscura
DEDOS	Carne oscura
UÑAS	Oscuras

Características de la hembra

PICO	Brunáceo manchado de negro en la extremidad de la mandíbula superior
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Frente, parte superior del cráneo y occipucio gris estriado de gris oscuro; trazos oculares amarillentos; mejillas grisáceas bañadas de bruno
ESPALDA	Grisáceo bañado de verde y estriado de gris oscuro
PECHO	Gris más claro estriado de gris oscuro
GARGANTA	Gris más claro ligeramente estriada de gris
FLANCOS	Gris claro estriado de gris oscuro
VIENTRE	Blanco grisáceo
ALAS	Todas las rémiges tienen un color atenuado gris verdoso con el borde de la orilla externa amarillento a partir de la tercera; las coberteras primarias y secundarias están terminadas por un borde verde bañado de gamuza con un reflejo amarillo muy pálido
OBISPILLO	Amarillo verdoso estriado de gris
COLA	El primer tercio de las rectrices es amarillento y los dos tercios restantes son gris verdoso salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris verdoso; las subcaudales son gris claro estriadas de gris
PATAS	Carne oscura
DEDOS	Carne oscura
UÑAS	Oscuras

Defectos clásicos del lugano verde diluido macho y hembra

Los mismos que las mutaciones bruna y ágata.

LUGANO (Mutación Bruna Diluida)

Características del macho

PICO	Brunáceo, teñido de bruno oscuro en la mandíbula superior
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Frente, parte superior del cráneo y occipucio bruna bañado de verde; trazos oculares amarillos claros; mejillas amarillentas bañadas de bruno
ESPALDA	Verdoso estriado de bruno oscuro
PECHO	Amarillo bastante claro bañado de bruno
GARGANTA	Amarillo claro con un ligero tinte beige
FLANCOS	Amarillentos bañados de beige delante y grisáceo bañado de beige detrás, los dos están estriados de bruno
VIENTRE	Blanco cremoso
ALAS	Todas las rémiges están diluidas en gris bruno con el borde de la orilla externa amarillo-brunáceo a partir de la tercera; las coberteras se terminan por una extremidad amarillo verdoso bordeada de bruno claro; esto hace una banda alar amarillo verdoso bordeada de bruno claro
OBISPILLO	Amarillo verdoso estriado de castaño oscuro
COLA	Los dos primeros tercios son amarillentos y el último tercio es gris bruno salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris bruno; subcaudal amarillo verdoso estriado de bruno oscuro
PATAS	Brunas
DEDOS	Brunos
UÑAS	Brunas oscuras

Características de la hembra

PICO	Brunáceo, manchado de bruno oscuro en la mandíbula superior
-------------	---

OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Frente, parte superior del cráneo y occipucio bruno estriada de bruno oscuro; trazos oculares amarillo claro; mejillas amarillentas bañadas de bruno oscuro
ESPALDA	Bruno-verdoso estriado de bruno oscuro
PECHO	Gris claro ligeramente estriado de bruno
GARGANTA	Gris claro muy poco estriado de castaño
FLANCOS	Gris claro bañado de beige y estriado de bruno oscuro
VIENTRE	Blanco cremoso
ALAS	Todas las rémiges están diluidas en gris bruno con el borde de la orilla externa amarillo-brunáceo a partir de la tercera; las coberteras se terminan en la extremidad amarilla bordeada de bruno claro; esto da lugar a una barra alar amarilla bordeada de bruno claro
OBISPILLO	Amarillo verdoso estriado de bruno oscuro
COLA	El primer tercio es amarillento y los dos últimos gris bruno salvo las dos rectrices medianas que son totalmente gris bruno; subcaudal gris beige estriada de bruno
PATAS	Bruno
DEDOS	Brunos
UÑAS	Bruno oscuro

Defectos clásicos del lugano bruno diluido macho y hembra

Las mismas que las mutaciones brunas, verde diluido y ágata.

LUGANO (Mutación Verde Doble Dilución)

Características del macho

PICO	Carne, manchado en la extremidad de la mandíbula superior
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Parte superior del cráneo gris bruno claro con un ligero dibujo; occipucio gris bruno claro; trazos oculares amarillos; mejillas gris verdoso estriado de claro; base del pico claro es tolerada
ESPALDA	Manto gris bruno extendiéndose hasta los hombros, sin estrías
PECHO	Amarillento ligeramente estriado de gris brunáceo
GARGANTA	El babero no se ve prácticamente; garganta amarillenta ligeramente estriada de gris brunáceo
FLANCOS	Amarillentos estriados de gris brunáceo
VIENTRE	Blanco sucio
ALAS	Pequeñas coberteras: gris bruno; Coberteras medianas: amarillo pálido bordeadas de amarillo intenso; Grandes coberteras: amarillo pálido bordeadas de amarillo intenso; Rémiges secundarias: gris claro con orilla amarilla y llevando una banda alar amarillo intenso; Rémiges primarias: gris claro con orilla externa amarilla a partir de la tercera; lunar o espejo no visible
OBISPILLO	Amarillo estriado de gris bruno
COLA	Los dos primeros tercios son amarillentos y el último tercio es gris claro con la orilla externa amarilla salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris claro
PATAS	Carne
DEDOS	Carne
UÑAS	Color cuerno

Características de la hembra

PICO	Carne, manchado en la extremidad de la mandíbula superior
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Parte superior del cráneo y occipucio gris bruno claro con un dibujo estriado muy ligero; trazos oculares amarillo claro; mejillas gris bruno claro estriadas de claro; la base del pico clara es tolerada
ESPALDA	Manto gris bruno extendiéndose hasta los hombros sin estrías
GARGANTA	Gris claro
PECHO	Gris claro ligeramente estriado de gris bruno
FLANCOS	Bruno claro estriado de gris bruno
VIENTRE	Blanco sucio
ALAS	Pequeñas coberteras: gris bruno; Coberteras medianas: gris verdoso bordeadas de amarillo intenso; Grandes coberteras: gris verdoso bordeadas de amarillo intenso; Rémiges secundarias: gris claro con orillas externas amarillo pálido formando una banda alar amarilla; Rémiges primarias: gris claro con orillas externas amarillo pálido a partir de la tercera; lunar o espejo no visible
OBISPILLO	Amarillo estriado de gris bruno
COLA	El primer tercio es amarillo y los dos últimos gris claro con orilla externa amarillenta salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris claro
PATAS	Carne
DEDOS	Carne
UÑAS	Color cuerno

LUGANO (Mutación Bruna Doble Dilución)

Características del macho

PICO	Carne manchado en la extremidad de la mandíbula superior
OJOS	Bruno oscuro
CABEZA	Parte superior del cráneo y occipucio bruno-beige; trazos oculares amarillos; mejillas brunas estriadas de blanco; base del pico claro es tolerada
ESPALDA	Manto bruno beige extendiéndose hasta los hombros sin estrías
GARGANTA	El babero prácticamente no es visible; garganta amarillenta ligeramente estriada de bruno-beige
PECHO	Amarillo ligeramente estriado de bruno-beige
FLANCOS	Amarillentos estriados de bruno-beige
VIENTRE	Blanco sucio
ALAS	Pequeñas coberteras: bruno beige; Coberteras medianas: amarillo pálido bordeadas de amarillo oscuro; Grandes coberteras: amarillo pálido bordeadas de amarillo oscuro; Rémiges secundarias: gris muy claro con la orilla externa amarilla formando una banda alar amarillo intenso; Rémiges primarias: gris muy claro con orilla externa amarillo pálido partir de la tercera; espejo o lunar no visible
OBISPILLO	Amarillo estriado de bruno
COLA	Los dos primeros tercios son amarillos y el último gris claro con orilla externa amarilla salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris muy claro
PATAS	Carne
DEDOS	Carne
UÑAS	Córnea claro

Características de la hembra

PICO	Carne manchado en la extremidad de la mandíbula superior
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Parte superior del cráneo y occipucio bruno beige con un dibujo estriado más ligero; trazos oculares amarillo claro; mejillas brunas estriadas de blanco; base del pico clara es tolerada
ESPALDA	Manto bruno beige extendiéndose hasta los hombros, sin estrías
GARGANTA	Gris muy claro
PECHO	Gris claro ligeramente estriado de bruno-beige
FLANCOS	Beige estriado de bruno
VIENTRE	Blanco sucio
ALAS	Pequeñas coberteras: bruno-beige; Coberteras medianas: amarillentas bordeadas de amarillo oscuro; Grandes coberteras: amarillentas bordeadas de amarillo oscuro; Rémiges secundarias: beige con la orilla externa amarillo pálido y formando una banda alar amarilla; Rémiges primarias: beige con orillas externas amarillo pálido a partir de la tercera; espejo no visible
OBISPILLO	Amarillo estriado de bruno
COLA	El primer tercio es amarillento y los dos últimos son beige con orilla externa amarillenta salvo las dos rectrices medianas que son enteramente beige
PATAS	Carne
DEDOS	Carne
UÑAS	Córnea claro

MIRLO CAPIBLANCO

(*Turdus torquatus alpestris*)

Características del macho



PICO	Largo, puntiagudo, robusto; amarillo en la base, pasando al negro de la punta
OJOS	Negros, bastante grandes; el cerco ocular está muy poco marcado
CABEZA	Fina y elegante, bien suelta del cuerpo; negro mate
CUELLO	Bastante largo, negro mate
GARGANTA	Negro mate
PECHO	Arriba del pecho tiene una mancha blanca neta, horizontal, en forma de <i>croissant</i> , formando un medio collar de un hombro al otro; parte baja del pecho negro mate indistintamente escamado de grisáceo
FLANCOS	Negro mate teniendo un escamado grisáceo bien contrastado y regular
VIENTRE	Negro mate escamado, uniéndose sobre la zona anal
ESPALDA	Negro mate, las plumas están orladas de un fino borde grisáceo bien nítido
ALAS	Largas y finas, rémiges negras ribeteadas de gris-blancuzco sobre los 2/3 inferiores de su longitud, esto hace que determine una zona clara sobre la parte de media ala; coberteras negras bordeadas de gris-blancuzco
OBISPILLO	Negro mate
COLA	Bastante larga; rectrices negro mate
PATAS	Bastante largas, robustas y negras
DEDOS Y UÑAS	Negros
FORMA GENERAL	Armoniosa y esbelta

Características de la hembra

El negro está reemplazado por un bruno sombrío; el dibujo del pecho es crema-grisáceo; el escamado está muy netamente marcado sobre la espalda y los flancos; la garganta es crema-grisáceo manchada de bruno oscuro o sombrío.

Defectos clásicos del mirlo capiblanco en machos y hembras

- Dibujo del pecho mal delimitado en los machos
- Escamado irregular en las hembras

Diámetro máximo de la anilla: 4,5 mm

MIRLO COMÚN

(*Turdus merula*)



Características del macho

PICO	Amarillo-naranja en los adultos; bruno-amarillo oscuro en los jóvenes del primer año
OJOS	Castaño oscuro con un cerco ocular amarillento
CABEZA	Negra
ESPALDA	Negro
PECHO	Negro; puede tener trazos bruno en los jóvenes machos del primer año del sur de Europa
FLANCOS Y VIENTRE	Negro
ALAS	Negras; grandes rémiges negro-brunáceo en los jóvenes del primer año
OBISPILLO	Negro
COLA	Negra: rectrices negro-brunáceo en los jóvenes del primer año
PATAS Y DEDOS	De color bruno oscuro
UÑAS	Negras

Características de la hembra

PICO	Bruno oscuro en las jóvenes hembras; trazos amarillos en la base del pico en las adultas
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Bruno oscuro o gris oscuro
MANTO	Bruno oscuro o gris oscuro
HOMBROS	Bruno oscuro o gris oscuro
ESPALDA Y OBISPILLO	Negrucos
COBERTERAS	Negrucos

SUB-CAUDALES

Negruczas

GARGANTA

Gris-brunáceo o gris claro con un dibujo perlado bruno oscuro

Defectos clásicos del mirlo común en machos y hembras

- Cerco ocular irregular en los machos
- Pico bicolor en las hembras

Diámetro máximo de la anilla: 4,5 mm



***DIFERENTES ETAPAS DEL CRECIMIENTO DEL MIRLO COMÚN
(Turdus merula)***

MIRLO COMÚN (Mutación Blanca)

Características del macho y de la hembra

DESCRIPCIÓN	Pájaro blanco puro
PICO	Amarillo
OJOS	Negro-bruno con cerco ocular amarillento
CUERPO	Blanco
ALAS	Blancas
PATAS	De color carne
DEDOS	De color carne
UÑAS	De color carne

Defectos clásicos del mirlo blanco en machos y hembras

- Color impuro
- Cerco ocular irregular

MIRLO COMÚN (Mutación Albina)

Características del macho y de la hembra

DESCRIPCIÓN	Blanco puro sin ningún dibujo
PICO	Amarillo
OJOS	Rojos, con un círculo ocular amarillento
CUERPO	Blanco
ALAS	Blancas
PATAS	De color carne
DEDOS	De color carne
UÑAS	De color carne

Defectos clásicos del mirlo común albino en machos y hembras

- Círculo ocular irregular
- Color impuro

PARDILLO COMÚN

(*Carduelis cannabina*)

Características del macho



PICO	Gris bruno tiene la punta sombreada; la mandíbula inferior es ligeramente más clara
OJOS	Castaños negros
CABEZA	Encima de la cabeza bruno-rosáceo estriado de bruno negro; un color subyacente puede rojizo aparecer sobre la frente; una zona circular gris-beige rodea al ojo y se prolonga a las cejas curvadas y alargadas; la mejilla está marcada de una mancha clara gris-beige que delimita un bigote bruno-negro partiendo en oblicuo de la comisura del pico
ESPALDA	Bruno-rosáceo estriado de bruno -negro
HOMBROS	Bruno-rosáceo
PECHO	Rosa-ocre bañado de bruno-rojo, con marcas más oscuras
GARGANTA Y MENTÓN	Grisáceo claro marcados de finas estrías oscuras que parten de la base del pico y se dispersan sobre el pecho, dibujando un babero indistinto
FLANCOS	Bruno-claro estriado de bruno-rojo
VIENTRE	Blancuzco
ALAS	Grandes rémiges negras con un ribete externo blanco formando un lunar o reflejo; rémiges secundarias y terciarias negruzcas aclaradas de bruno-rojo; coberteras y escapulares bruno-rojo
OBISPILLO	Beige ligeramente estriado
COLA	Rectrices negras ribeteadas de blanco sobre el borde externo

PATAS Y DEDOS	Brunáceas
UÑAS	Oscuras

Observaciones

En período nupcial el pecho y la frente son rojo-carmín claro; la cabeza es más gris.

Características de la hembra

La hembra tiene las mismas características del macho pero el pecho, la cabeza y los flancos están estriados. No tiene rosa en la cabeza ni en el pecho. También es menos blanca en la rectrices y rémiges.

Defectos clásicos del pardillo común en los machos y hembras

- Dibujo de la cabeza de la garganta y de las mejillas irregular
- Dibujo de los flancos irregular
- La orilla blanca de las rémiges y rectrices no es visible
- Dibujo del pecho irregular en las hembras

Diámetro máximo de la anilla: 2,7 mm



PARDILLO DE HORNEMANN

(*Carduelis hornemanni*)

Características del macho



PICO	Cónico, fino y puntiagudo; de color córnea amarillento; la mandíbula superior es más oscura que la inferior
OJOS	Negros
CABEZA	Redonda, bien embutida en los hombros; fina banda frontal y lore bruno-negrusco; mancha rojo-carmín en forma de casco partiendo de la frente y cubriendo la mitad del cráneo; línea ocular gris-bruno superpuesta sobre una fina ceja gris-beige; detrás del cráneo y nuca gris-beige estriado, negruzco; dibujo de las mejillas ligeramente marcado
ESPALDA	Beige-grisáceo marcado regularmente de estrías bruno-negras, con una zona más clara en el centro
GARGANTA	Pequeño babero negro-bruno en el mentón; garganta blancuzca, un ligerísimo reflejo rosa puede aparecer a veces en subespecies
PECHO	Blancuzco como la garganta; puede ser también ligeramente rosa. (subespecies)
FLANCOS	Beige-grisáceo muy claro, estriado de bruno negro
VIENTRE	Blanco
ALAS	Grandes rémiges negruzcas finamente ribeteadas de castaño claro; rémiges secundarias negruzcas teniendo un ribete gris-beige más ancho; coberteras negruzcas bordeadas de blanco sucio formando una doble barra alar
OBISPILLO	Blancuzco; ligeramente estriado o lavado de rosa aceptado en subespecies
COLA	Rectrices negruzcas teniendo un ribete gris-beige
PATAS Y DEDOS	Castaño-negro
UÑAS	Negras
FORMA GENERAL	Bastante redonda, rechoncho y elegante

Observaciones

La mancha rosa de la cabeza puede estar ausente o reemplazada por un matiz amarillo-naranja.

Características de la hembra

Parecida al macho; la mancha rosa de la cabeza es más pequeña y la barbilla o babero es menos pronunciado.



Defectos clásicos del pardillo de Hornemanni machos y hembras

- Demasiado oscuro (puede estar ligeramente oscurecido)
- Trazos superciliares irregulares
- Babero irregular
- Estrías de flancos irregulares
- Color del pico rojizo
- Banda alar irregular o incompleta
- Exceso de coloración roja

Diámetro máximo de la anilla: 2,7 mm



PARDILLO PIQUIGUALDO

(*Carduelis flavirostris*)



Características del macho

PICO	Pequeño, amarillo con punta negruzca
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Pequeña y redonda; frente, corona, mejillas y nuca bruno-ocre estriada de negro; lore de color herrumbre
ESPALDA	Bruno-ocre estriado de bruno negruzco
HOMBROS	Ocre, un poco más luminoso que la espalda
PECHO	Bruno-ocre con estrías bruno oscuro partiendo del medio del pecho hacia los flancos
GARGANTA	Bruno-ocre ligeramente estriada
FLANCOS	Bruno-ocre con estrías brunas oscuras y muy regulares
VIENTRE	Blanco sucio
ALAS	Bruno-negruzco con una estrecha banda blanca a lo largo de la orilla externa de las rémiges
OBISPILLO	Rosa-carmín en la naturaleza pero ocre-rojo no es penalizable
COLA	Bruno-negruzco con ribete blancuzco a lo largo de la orilla externa; extremidad de la cola ahorquillada
PATAS Y DEDOS	Bruno negruzco

Características de la hembra

La hembra es igual que el macho, pero es de color más pálido. El obispillo no es nunca rojo-carmín pero sí bruno-gris suave, con estrías negras y estrechas.

Defectos clásicos del pardillo piquigualdo machos y hembras

- No es visible el ribete blanco de las rémiges
- Irregularidades en el dibujo de los flancos y del pecho
- Cabeza aplanada
- Patas demasiado claras

Diámetro máximo de la anilla: 2,7 mm

PARDILLO SICERÍN

(*Carduelis flammea flammea*)

Características del macho



PICO	Fino y puntiagudo con la mandíbula superior brunácea y la inferior amarillenta
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Frente brunácea; la mitad de la parte superior del cráneo es rojo-carmín en la naturaleza; este color puede ser reemplazado por el de un amarillo bruno; la pérdida del color carmín no es penalizable; los trazos superciliares estrechos y regulares comienzan sobre los de los ojos, y van sobre la nuca y son de un color ligeramente brunáceo; un fino ribete negro alrededor del pico; el lore es negro; las mejillas y la región auricular tienen un dibujo en forma de media luna y son de color castaño oscuro
CUELLO, ESPALDA Y HOMBROS	Brunos con estrías estrechas y regulares castaño oscuro; una zona mediana bruno claro parte entre los hombros hasta el obispillo
PECHO	El alto y los lados del pecho son rosa carmín en la naturaleza; este color puede ser reemplazado por un bello tinte castaño vivo
GARGANTA	Pequeño babero negro mate obligatorio sobre el mentón; tiene el tamaño de un pequeño guisante; el color de la garganta es rosa-carmín o castaño vivo
FLANCOS	Color de fondo blanco sucio y regularmente estriado de finas rayas castaño-negruczas que parten a la altura de los hombros y que descienden todo lo largo de los flancos
VIENTRE	Blanco sucio
ALAS	Las grandes rémiges son de un color castaño negruzco ribeteadas de castaño muy claro en la extremidad; las grandes coberteras y coberteras primarias llevan un ribete claro formando dos barras alares beige ligero

OBISPILLO	Teñido de rosa carmín o castaño vivo y estriado de castaño oscuro
COLA	Las rectrices son de un bruno negruzco, ribeteado de bruno muy pálido a la extremidad
PATAS, DEDOS	Castaño oscuro
UÑAS	Negras

Características de la hembra

La hembra tiene las mismas características que el macho, pero ella no tiene rojo-carmín o amarillo-castaño sobre el pecho, únicamente sobre la parte superior del cráneo.



Observaciones

Los sizerines del primer año no tienen nunca rojo carmín sobre el pecho. En la subespecie "cabaret" la talla es un poco más reducida, el color del conjunto es castaño más vivo y en la espalda no tiene zona clara.


Defectos clásicos de los sizerines machos y hembras

- Demasiado oscurecido (puede estar ligeramente oscurecido)
- Trazos superciliares irregulares
- Babero de forma irregular
- Estrías de flancos irregulares
- Color del pico rojizo
- Banda alar irregular ó incompleta

Diámetro máximo de la anilla: 2,5 mm

PARDILLO SICERÍN (Mutación Bruna)

Características del macho



PICO	Fino y puntiagudo con la mandíbula superior brunácea y la mandíbula inferior amarillenta
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Frente bruno-beige y parte superior del cráneo rojo-rosa; mejillas y región auricular brunas; trazos superciliares beige
ESPALDA	Bruno vivo con estrías brunas oscuras estrechas y regulares
GARGANTA	Bruna, con un babero de un bruno más oscuro, OBLIGATORIO
PECHO	Bruno claro con estrías bruno-vivo sobre el alto del pecho; estas marcas son obligatorias en el "cabaret"; en los machos adultos, el pecho puede ser bruno tenido de rosa
FLANCOS	Color de fondo bruno claro, estriado de finas rayas bruno vivo partiendo de los hombros hacia atrás y bien regularizadas

VIENTRE	Blanco sucio
ALAS	Grandes rémiges brunas con un ribete beige al extremo de las plumas; barras alares ligeramente más claras (menos visibles en el cabaret)
OBISPILLO	Bruno estriado de bruno vivo y teñido de rosa en los machos adultos
COLA	Rectrices brunas con ribetes más claros
PATAS Y DEDOS	Color carne
UÑAS	Oscuras

Características de la hembra

Las marcas los tintes de las hembras son idénticos a los de los machos salvo el color del pecho que es ligeramente más claro en las hembras y lo mismo en los flancos (esto es al contrario de la mayor parte de las mutaciones brunas).


La hembra no tiene rosa ni en el pecho ni en el obispillo.

Defectos clásicos de los sizerines brunos en los machos y en las hembras

- Ausencia de bruno sobre los lados del pecho
- Reflejos grisáceos sobre las alas
- Ausencia de estrías brunas sobre los lados del pecho

PARDILLO SICERÍN (Mutación Ágata)

Características del macho y de la hembra



PICO	Amarillento con la mandíbula superior oscurecida
OJOS	Negros
CABEZA	Frente gris-beige; la mitad de la parte superior del cráneo es roja-rosa pero que puede estar reemplazada por amarillo-bruno; la pérdida del color rojo no es penalizable; los trazos superciliares estrechos y regulares nacen por encima del ojo, cayendo sobre la nuca y son de un color gris beige; las mejillas y la región auricular tienen un dibujo en forma de media luna y son de color gris-bruno teñida de rosa, lore grisáceo
CUELLO, ESPALDA Y HOMBROS	Gris claro con estrías regulares de color gris oscuro; estas estrías son entrecortadas
GARGANTA	Pequeño babero sobre el mentón de color gris oscuro bien dibujado es OBLIGATORIO; la garganta es de color claro
PECHO	Color gris claro de fondo con estrías grises sobre lo alto del pecho; en los machos adultos el pecho puede ser rosa
FLANCOS	Color de fondo gris claro regularmente estriado de gris, las estrías parten de lo alto del pecho y descienden a lo largo de los flancos
VIENTRE	Blanco sucio
ALAS	Las grandes rémiges son gris oscuras y ribeteadas de gris claro a la extremidad; dos barras alares gris claro

OBISPILLO	Color de fondo gris claro y estriado de gris oscuro
COLA	Las rectrices son gris oscuras ribeteadas de gris claro a lo largo de la extremidad
PATAS Y DEDOS	Grisáceos
UÑAS	Negras

Defectos del pardillo sizerín mutación ágata machos y hembras

- Abundancia de bruno
- Dibujo irregular

PICOGORDO

(*Coccothraustes coccothraustes*)

Características del macho



PICO	En invierno de color cuerno pálido; en verano de color azul acero; color intermedio posible en invierno
OJOS	Gris-brunáceo, cercos oculares bruno-rojizo
CABEZA	La parte alta de la cabeza es bruno claro sobre la frente y oscuro sobre el occipucio; el ribete frontal, el lore, mentón y alrededor del pico es negro; la región auricular y las mejillas tienen un color bruno-amarillento; el bajo de las mejillas y las partes inferiores del cuello son de un color gris claro
ESPALDA	La espalda, el manto y las escapulares son de un color bruno oscuro; el bajo de la espalda es bruno-grisáceo; el obispillo y las sub-caudales son de un color bruno-amarillento
GARGANTA	Barbilla negra rodeando el mentón y la garganta con un ligero ribete muy pálido alrededor de la barbilla (el mínimo será el mejor)
PECHO	Gris-brunáceo pálido escarchado de rosa color vino
FLANCOS	Bruno-grisáceo, más oscuro que el pecho
VIENTRE	Gris-blancuzco con las sub-caudales blancas
ALAS	Las rémiges primarias y secundarias son negras con reflejos metálicos; la extremidad de las rémiges primarias internas y de las rémiges secundarias externas tienen la forma de un abanico; las grandes coberteras alares son blancas y forman una amplia barra alar
COLA	Corta; las rectrices medianas son rosadas y las rectrices externas son negras con la extremidad blanca; esto forma una banda blanca en la extremidad de la cola

PATAS Y DEDOS	De color bruno carne
UÑAS	Bruno oscuro

Características de la hembra

La hembra tiene las mismas características que el macho pero los tintes son más pálidos y más grises. En verano, el pico tiene un color menos intenso que el de los machos. La extremidad de la cola es menos blanca que la de los machos. Las rémiges primarias son más grises que en los machos.

Defectos clásicos del picogordo en machos y hembras

- Barbilla irregular
- Coberteras de las alas irregulares o incompletas
- Color del pecho jaspeado
- Flancos demasiado claros
- Borde del collar gris irregular
- Círculo ocular incompleto
- Pico con escamas
- Abanicos irregulares en la extremidad de las rémiges
- Lesión en la frente


Diámetro máximo de la anilla: 3,5 mm



PINZÓN REAL

(*Fringilla montifringilla*)

Características del macho



PICO	Amarillento con punta negra
OJOS	Castaños oscuros
CABEZA	Frente, parte superior del cráneo, nuca, mejillas y región auricular de un color negruzco ribeteado o biselado de un bruno-gris; este color está uniformemente repartido; en verano, la cabeza es completamente negra, excepto la garganta
GARGANTA	Bruno avellana
PECHO	De color bruno-naranja, sin velado y uniformemente repartido sobre el conjunto del pecho; la línea que separa el bruno del pecho y el blanco del vientre debe de ser regular y ligeramente redondeada
FLANCOS	El color de los flancos es de un bruno-naranja claro con preferencia dos hileras de puntos negros repartidos lo más uniformemente posible; la primera hilera estará siempre cubierta por el ala; los puntos de los machos son más largos y con tendencia a agruparse delante, que en las hembras
VIENTRE	Blanco puro
ALAS	Las escapulares bruno-naranja dibujando una raya longitudinal que va desde los hombros al nacimiento de las rémiges terciarias; esta zona está delimitada por una primera barra alar blancuzca formada por las pequeñas coberteras; las grandes coberteras son negras orladas de un bruno-naranja que dibujan una

segunda barra alar; las rémiges primarias son negro-bruno oscuro y tienen en su base una marca blanca que forma un pequeño espejuelo; las otras rémiges son negro-brunáceo con la orilla externa bruno claro

BAJO DE LA ESPALDA Y OBISPILLO Blanco en su parte central

COLA Las rectrices son negras; las dos rectrices externas tienen una gran mancha blanca longitudinal sobre el lado inferior; las sus-caudales medianas son negruzcas con un ribete bruno en la extremidad; la extremidad de la cola es ahorquillada

PATAS Y DEDOS Carne oscura

UÑAS Negras

Características de la hembra

CABEZA Como en el macho pero los tintes son bruno-gris en el conjunto; dos rayas brunas parten de lo alto de la cabeza y descienden sobre la nuca

ESPALDA Dibujo escamado típico de color gris bruno

PECHO El color no puede ser diluido sino de un bruno-naranja que estará ligeramente oculto por lo tanto menos intenso que en los machos

FLANCOS Los puntos deben de estar bien repartidos y regulares, en dos rayas y sobre fondo bruno-claro

VIENTRE Blanco-grisáceo

ALAS Como el del macho pero de un color menos brillante


Defectos clásicos del pinzón real machos y hembras

- Círculos oculares irregulares
- Color del pecho deslucido
- Patas bicolores
- Mancha blanca o negra sobre el mentón
- Puntos demasiado agrupados sobre los flancos
- Línea de separación del pecho irregular
- Reflejos de las alas ausentes o poco visibles
- Estrías de la cabeza de la hembra poco regulares

Diámetro máximo de la anilla: 2,9 mm

PINZÓN VULGAR (*Fringilla coelebs*)

Características del macho



PICO	Azul acero en verano; bruno gris con la extremidad más oscura en invierno
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Frente negra, corona, occipucio y nuca gris azulado; mejillas, lore, región auricular, mentón, cejas pasando del rosa-bruno al rojo bruno. Ciertos sujetos pueden presentar cercos oculares blancos
ESPALDA	Bruno marrón
HOMBROS	Gris-azulado
PECHO Y GARGANTA	Pasando del bruno-rosa al bruno-rojo color de vino
FLANCOS	Éstos deben de ser del mismo color del pecho
VIENTRE	Región anal blanca
ALAS	Rémiges primarias de color bruno-negro; rémiges secundarias de color bruno-negro con un ribete amarillento en la parte inferior de la rémiges; hombros (sus-ales) blancas; barra alar blanca y un pequeño espejo o reflejo blanco

OBISPILLO	Verde oliva teñido de amarillo
COLA	Rectrices bruno-negruczcas enteramente ribeteadas de verde a lo largo de la orilla externa; las rectrices externas tienen una gran banda blanca a lo largo de toda la parte inferior
PATAS Y DEDOS	Bruno-claro
UÑAS	Negruczcas

Características de las hembras



PICO	Gris-bruno
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA Y ESPALDA	Gris-bruno
HOMBROS	Bruno-beige
PECHO	Gris-bruno; puede estar teñido de rosa en algunas variedades meridionales
GARGANTA	Gris-bruno; una zona clara es tolerada
FLANCOS	Gris-bruno sin ser deslucido
VIENTRE	Región anal gris-blanco sucio
ALAS	Como el macho pero más bruno; la barra alar es menos blanca que en los machos
OBISPILLO	Verde teñido de amarillento
COLA	Las mismas características que el macho pero más bruno
PATAS Y DEDOS	Bruno claro
UÑAS	Negruczcas


Defectos clásicos del pinzón vulgar en machos y hembras

- Dibujos de las mejillas irregulares
- Barras alares irregulares o incompletas
- Reflejos o espejuelos no bastante visibles o asimétricos
- Flancos demasiados claros
- Color del pecho irregular

Diámetro máximo de la anilla: 2,9 mm

PINZÓN VULGAR (Mutación Bruna)

Características del macho



PICO	Bruno claro
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Bruno con la banda frontal más oscura
ESPALDA	Bruno
GARGANTA, PECHO Y FLANCOS	Bruno con un oculto color de vino
VIENTRE	Bruno claro
ALAS	Pequeñas coberteras brunas; coberteras medianas brunas con una barra escapular blanca; grandes coberteras brunas con una barra alar crema; rémiges secundarias brunas y rémiges primarias brunas con un reflejo blanco
OBISPILLO	Bruno

COLA	Bruna con dibujo blanco bajo la cola
PATAS Y DEDOS	De color carne
UÑAS	De color carne

Características de la hembra

PICO	Bruno claro
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA, ESPALDA, GARGANTA, PECHO Y FLANCOS	Bruno vivo
VIENTRE	De color crema sobre la región anal
ALAS	Pequeñas coberteras bruno vivo; coberteras medianas bruno vivo con una barra escapular blanca; grandes coberteras bruno vivo con una barra alar de color crema; rémiges secundarias bruno vivo; rémiges primarias bruno vivo con un reflejo blanco
OBISPILLO	Bruno vivo
COLA	Bruno vivo con dibujo blanco bajo la cola
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color carne


Defectos clásicos del pinzón vulgar bruno macho y hembra

- Color irregular
- Bandas alares desordenadas

PIQUITUERTO COMÚN

(*Loxia curvirostra*)

Características del macho



PICO	Bruno-gris oscuro y cruzado completamente; mandíbula superior más larga que la inferior; raíz de la mandíbula inferior más clara; la dirección de la forma de las mandíbulas no tiene importancia
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Frente, vertex y nuca son de un color rojo vivo; ciertos piquituertos pueden tener un dibujo escamado sobre el vertex, aunque otros tienen el vertex de color uniforme (los dos son válidos); dibujo en forma de herradura brunácea sobre las mejillas; lore y región auricular bruna oscura matizada de rosa; bajo de la nuca menos rojo y más bien brunácea
ESPALDA	Manto y escapulares rojo menos vivo que el pecho pero más bien de un rojo-brunácea
PECHO Y FLANCOS	Bruno-rojizo
VIENTRE	Bruno-grisáceo como la región anal
ALAS	Rémiges primarias de color negro-brunácea con un estrecho ribete rojizo o brunácea a lo largo de la orilla externa; el extremo de las rémiges poseen un borde grisáceo; coberteras su-alares de color bruno oscuro; las pequeñas y medianas coberteras sobre-alares tienen un borde rojizo
COLA	Rectrices de color negro brunácea con un estrecho ribete rojizo o amarillento a lo largo de la orilla externa; su-caudales grisáceas con un dibujo escamado (forma de V); cola corta y sesgada
PATAS Y DEDOS	Color bruno oscuro
UÑAS	Negras

Observaciones

En los jóvenes machos el color es bastante variable; ciertos machos son de un color rojo-ladrillo, naranja, amarillo. Estos colores son válidos a condición de que estén repartidos uniformemente y no estén manchados.

Características de la hembra



La hembra posee las mismas características que el macho pero el color de casi todas las partes del cuerpo es verde-olivagrisáceo. La hembra está más estriada de bruno en el conjunto que el macho especialmente sobre la cabeza, el pecho, la espalda y los flancos. El obispillo es amarillo-verdoso. La hembra posee un dibujo frontal típicamente gris-claro.

Defectos clásicos del piquituerto en machos y hembras

- Color del pecho irregular
- Extremidades del pico rotas o gastadas
- Dibujos de las su-caudales irregulares
- Dibujos de las mejillas irregulares
- Color del conjunto manchado
- Estrías entrecortadas sobre todo en las hembras

Diámetro máximo de la anilla: 3,5 mm

PIQUITUERTO FRANJEADO

(*Loxia leucoptera bifasciata*)



Características del macho

PICO	Color córnea, bastante largo; las mandíbulas se cruzan en la extremidad de forma muy pronunciada
OJOS	Negros
CABEZA	Bastante ancha, cráneo plano, aspecto robusto y corto; enteramente rojo-carmín; ligeramente escamado con la zona loreal y el dibujo de las mejillas gris; la cima del cráneo y la nuca tiene una ligera su-fisión gris
ESPALDA	Rojo-carmín escarchado de gris y débilmente escamado
PECHO Y GARGANTA	Rojo-carmín
FLANCOS	Rojo-carmín indistintamente teñido de gris
VIENTRE	Rojo-carmín degradándose en blanco sucio sobre la zona anal
ALAS	Rémiges negras ribeteadas de blanco; las rémiges secundarias externas están más ampliamente ribeteadas, sobre todo en la extremidad; coberteras negras con una neta orla blanca que dibuja una doble barra alar muy neta
OBISPILLO	Rojo-carmín ligeramente escamado en todo su contorno
COLA	Bastante corta, ligeramente sesgada, rectrices negras muy finamente ribeteadas de grisáceo
SUB-CAUDALES	Tienen un dibujo escamado típico que debe de ser regular
PATAS	Gris-bruno, robustas y bastante cortas
DEDOS	Gris-bruno
UÑAS	Color cuerno
FORMA GENERAL	A la vez sólida y elegante; un poco más pequeña y más fina que el piquituerto común

Observaciones

El color de fondo puede variar del rojo-carmín, al rojo-ladrillo o al naranja.

Características de la hembra

La hembra presenta el mismo dibujo que el macho, el color de fondo rojo-carmín esta reemplazado por un tinte verdoso más o menos aclarado de amarillo; el obispillo es amarillo; la espalda tiene un escamado

sombrío; la cabeza, el pecho y los flancos están más o menos estriados; las rémiges y las rectrices son negro-brunáceo.

Defectos clásicos del piquituerto franjeado en machos y hembras

- Falta de uniformidad en el color del fondo
- Barras alares indistintas o coloreadas
- Forma del pico defectuosa
- Falta de regularidad y de nitidez en el dibujo

Diámetro máximo de la anilla: 3,5 mm

PIQUITUERTO LORITO

(*Loxia pityopsittacus*)



Características del macho

PICO	Color cuerno, poderoso de forma bastante tosca, las extremidades de las mandíbulas se cruzan en la forma de una cizalla
OJOS	Negros
CABEZA	Ancha, poderosamente encajada sobre los hombros; frente y vertex de rojo-carmín a rojo-ladrillo; lore y nuca escarchada de bruno; dibujo de las mejillas bruno
ESPALDA	Rojo fuertemente mezclado de bruno y teniendo estrías bastante fundidas
PECHO	Rojo más o menos escarchado de bruno
GARGANTA	Rojo-carmín al rojo-ladrillo liso
FLANCOS	Rojo-brunáceo
VIENTRE	Blanco-grisáceo, ligeramente estriado sobre los lados
ALAS	Rémiges bruno-negruczas llevando un estrecho ribete más claro; grandes coberteras bordeadas de bruno-rojizo
OBISPILLO	Rojo carmín al rojo-ladrillo
COLA	Corta, sesgada, rectrices bruno-negruczo estrechamente bordeadas de bruno; sus-caudales débilmente escamada sobre el contorno
PATAS	Color cuerno; cortas y robustas
DEDOS	Color cuerno
UÑAS	Bruno-negro
FORMA GENERAL	Poderosa, muy macizo

Observaciones

El color del fondo puede variar del rojo al naranja más o menos aclarado de amarillo.

Características de la hembra

La hembra presenta el mismo dibujo que el macho. El rojo está reemplazado por un tinte bruno-oliva más luminoso en el pecho y en el obispillo. Las estrías están más marcadas.

Defectos clásicos del piquituerto lorito en machos y hembras

- Falta de uniformidad en el color
- Pico defectuoso
- Falta de regularidad en el dibujo
- Estrías demasiado fundidas o irregulares en la hembra

Diámetro máximo de la anilla: 4 mm

TRIGUERO

(*Emberiza calandra*)

Características del macho y de la hembra



PICO	Grueso, amarillento con la extremidad gris
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	De color bruno-grisáceo; ligeras cejas beige; estriado de gris oscuro; dibujo beige en la base de las mejillas (en forma de media luna); garganta beige con dos trazos de barba gris oscuros
ESPALDA Y HOMBROS	Bruno estriado de gris-bruno oscuro
PECHO	Beige estriado de gris oscuro formando una mancha en su centro
FLANCOS	De color beige y estriado de gris oscuro
ALAS	Brunas oscuras con un ligero ribete beige a lo largo de la orilla externa prolongándose justo al extremo de las rémiges primarias; barra alar visible sobre las coberteras medianas
OBISPILLO	Bruno y menos estriado que la espalda
COLA	Rectrices de color bruno oscuro con el ribete beige a lo largo de la orilla externa
PATAS Y DEDOS	De color amarillento
UÑAS	Brunas

Observaciones

La talla varía de un individuo a otro.

Defectos clásicos del triguero macho y hembra

- Estrías irregulares

- Dibujo de las mejillas irregulares
- Color de fondo demasiado mate
- Demasiado pequeño de talla y forma poco robusta
- Plumas decoloradas alrededor de los ojos

Diámetro máximo de anilla: 3,5 mm

URRACA

(*Pica pica*)

Características del macho y de la hembra



PICO	Negro, con pelos eréctiles en su base negros
OJOS	Negrucos
CUELLO Y ESPALDA	Negro azabache brillante
GARGANTA Y MENTÓN	Negro azabache brillante
ALTO DEL PECHO	Negro azabache brillante
SUS Y SUB-CAUDALES	Negro azabache brillante
CABEZA	Negra, con un reflejo purpúreo-verdoso
ESCAPULARES	Negro con un reflejo púrpura-verdoso
BAJO DEL PECHO	Blanco
VIENTRE Y FLANCOS	Blanco
GRANDES SUPRA-ALARES	Blancas
ALAS	Rémiges primarias y secundarias negras con un reflejo metálico
COLA	Rectrices largas, negras con reflejos metálicos verdes y azules a la extremidad separadas por una banda ocre; las rectrices están escalonadas dos a dos
PATAS, DEDOS Y UÑAS	Negras

Observaciones

Las primeras rémiges externas son siempre gradualmente más cortas que las otras.

Características de la hembra

La cola de la hembra es más larga y más ancha que la del macho.

Defectos clásicos de la urraca en machos y hembras

- Color blanco impuro
- Borde de la barbilla irregular
- Dibujos blancos de las coberteras en dientes de sierra

Diámetro máximo de la anilla: 7,2 mm

VERDECILLO

(*Serinus serinus*)

Características del macho



PICO	Pequeño, cónico, corto y gris oscuro
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Amarillo vivo partiendo de la base del pico hasta ambos ojos pasando de un gris verde estriado a un gris-bruno sobre el cráneo, la nuca y las mejillas
CUELLO	Medio collar amarillento
ESPALDA	Gris-brunáceo estriado de negro
HOMBROS	Gris-brunáceo
PECHO	Amarillo vivo
GARGANTA	Amarillo vivo
FLANCOS	Pasando del amarillo claro en la región de los hombros al gris claro sobre el vientre, estriado de bruno-negruzco
VIENTRE	Gris claro
ALAS	Gris-negruzco con ribete amarillo-verdoso en el borde exterior de las rémiges; dos bandas alares amarillo-verdoso están formadas por el ribete claro de las grandes y medianas coberteras
OBISPILLO	Amarillo vivo
COLA	Rectrices gris-negruzcos bordeadas por un amarillo-verdoso
PATAS	Color carne
DEDOS	Color carne
UÑAS	Castaño oscuro

Observaciones

La intensidad del amarillo puede variar bastante de un individuo a otro.

Características de la hembra

La hembra tiene las mismas características que el macho pero el color amarillo vivo del macho está más atenuado en las hembras sobre todo en la cabeza, garganta y el obispillo; el pecho es gris verdoso. La hembra está más estriada sobre la garganta, el pecho y los flancos que el macho. Las estrías son más largas y más diferenciadas.



Defectos clásicos del verdecillo macho y hembra

- Colores empañados y degradados sobre todo en el macho
- Estrías de los flancos irregulares
- Dibujo de la cabeza irregular
- Barras alares irregulares

Diámetro máximo de la anilla: 2 mm

VERDERÓN COMÚN

(*Carduelis chloris*)

Características del macho



PICO	Grueso y cónico; de color carne teñido de bruno
OJOS	Castaños oscuros
CABEZA	Gruesa, ancha, aplanada con el cuello bien relleno; de color verde; frente bien marcada; bigotes y mejillas gris-ceniciento
ESPALDA	Verde-oliva con reflejos brunáceos
HOMBROS	Verde-amarillento luminoso
PECHO	Verde-oliva luminoso
GARGANTA	Verde-amarillo luminoso
FLANCOS	Verde-oliva
VIENTRE	Gris-blanquecino
ALAS	Grandes rémiges negro-brunáceo con la orilla externa amarillo vivo formando un reflejo sobre las 2/3 partes superiores; rémiges secundarias gris negruzcas con un ribete gris más claro en la extremidad; el ala está bordeada de amarillo del hombro en la extremidad de las rémiges bastardas, a continuación del espejo o lunar
COLA	Amarillo vivo en la base y negro-brunáceo en la extremidad con un ribete gris a lo largo de toda la orilla externa; las dos rectrices medianas son de un color negro-brunáceo en toda la longitud; la cola es corta con la extremidad ahorquillada
PATAS Y DEDOS	De color carne
UÑAS	Color carne oscura

Observaciones

Hay que tener en cuenta que existen pájaros nevados e intensos, esta diferencia está bien marcada en los verderones; los jóvenes machos pueden presentar un reflejo bruno.

Características de las hembras

Tiene las mismas características que el macho pero el color es bruno-grisáceo. El ribete amarillo de las rémiges y de las rectrices son menos anchas y más atenuadas. La orla amarilla del hombro no existe. Ciertas hembras pueden presentar una tonalidad más bruna pero más estriada sobre la espalda, o una tonalidad más verde con menos estrias.



Defectos clásicos en el verderón común en los machos y en las hembras

- Cabeza demasiado plana y demasiado pequeña
- Giba en la nuca
- Dibujos de las mejillas no visibles
- Cuerpo no bastante rechoncho
- Ribete amarillo no visible en los machos
- Espalda hundida
- Mancha amarilla sobre la frente

IMPORTANTE: El cuerpo de los verderones debe de ser rechoncho y de una buena talla. Este pájaro debe de ser elegante en su presentación, no debe de estar acostado sobre el palo sino todo lo contrario, debe de levantar el cuerpo y presentar cierta fiereza. Un buen ejemplar de exposición debe de tener el cuello bien repleto y una cabeza bastante fuerte. Esto es igualmente valido para las mutaciones.

Diámetro máximo de la anilla: 3 mm



VERDERÓN COMÚN (Mutación Ágata)

Características del macho



Los dibujos de la perilla y de los trazos superciliares deben de estar bien marcados y de color gris muy oscuros; el manto debe de ser de un color verde-almendra escarchado de gris bien repartido y regular y si es posible ligeramente estriado.

El color de las rémiges y de las rectrices debe de ser lo más oscuro posible, tirando al negro; un ribete grisáceo termina en las rectrices y las rémiges. El pecho tiene un color de fondo verde-amarillento luminoso pero escarchado de gris. Los flancos son de un color gris bien repartido como el del manto.

Características de la hembra

La perilla y los trazos superciliares deben de estar bien marcados y de color gris muy oscuro. El color general del cuerpo es gris; este color está estriado de gris oscuro sobre los flancos, sobre la espalda y sobre lo alto del pecho. El ribete grisáceo de las rémiges y de las rectrices es como en los machos.

Defectos clásicos de los verderones ágatas machos y hembras

- Reflejos beige sobre la espalda, el pecho y los flancos

VERDERÓN COMÚN (Mutación Bruna)

Características del macho

La perilla y los trazos superciliares deben de estar bien afirmados y de color bruno y bien visibles. El conjunto del cuerpo del macho será de un bruno ligero, sobre la espalda y sobre los flancos; el termino de las rémiges y de las rectrices serán lo menos decoloradas posibles; el ribete será inexistente. "El más bruno será siempre el mejor".

Observaciones

El color de fondo de un verde bruno macho es de un amarillo-dorado y quedará visible sobre el pecho, los flancos y el obispillo; esto no es una falta.

Características de las hembras

La hembra presentará un color bruno vivo sin estrías uniformemente repartido sobre todo el cuerpo, la perilla y los trazos superciliares serán bien visibles.

Observaciones

El color de fondo de la hembra está enmascarado por el bruno; una hembra no debe tener el amarillo del pecho.

VERDERÓN COMÚN (Mutación Isabela)

Características del macho



Los dibujos de la perilla y de los trazos superciliares deben de estar bien afirmados y de color beige oscuros.

La cima de la cabeza y los flancos son de color café (beige); el manto es amarillo teñido de beige.

El pecho es de color amarillo luminoso.

Las rémiges y las rectrices son de un color amarillo bastante sostenido, éstas están terminadas por un ribete beige bien visible.

Características de la hembra

El dibujo de la perilla y de los trazos superciliares deben de estar bien marcados como en el macho.

Todo el cuerpo es de un color café con leche (beige) bien repartido; el color de fondo no debe de ser visible.


Las rémiges y las rectrices son de un color más diluido que en el macho.

Un ligero dibujo de estrías sobre la espalda es deseado pero no obligatorio.

Defectos clásicos de los verderones isabelas machos y hembras

- Reflejos grises sobre el manto, el pecho y los flancos

VERDERÓN COMÚN (Mutación Lutina)



Estos pájaros machos y hembras tienen los ojos rojos (color rubí).

El pico y las patas son de color carne.

Características del macho intenso

De color amarillo-junquillo muy bien repartido sobre el conjunto del cuerpo del pájaro; en los jóvenes machos, las grandes rémiges y las rectrices serán casi blancas.

Características del macho *schimmel* (nevado)

El nevado debe estar bien repartido y ligero: el nevado no debe ser demasiado pesado en el cuello.

Observaciones

En los sujetos nevados el aspecto general será más blanco.


Características de las hembras

La mayor parte del cuerpo será blanca marcada de manchas amarillas (tipo mosaico) que deben ser simétricas.

El color amarillo de los hombros, de los trazos superciliares, del obispillo, de las grandes rémiges y de la orilla externa de las rectrices deben estar bien marcadas y regularizadas.

Un ligero viso sobre el pecho atenúa el color blanco.

VERDERÓN COMÚN (Mutación Isabela Satiné)



Estos verderones, machos y hembras, tienen siempre los ojos rojos (color rubí). El pico y las patas son de color carne.

Características del macho

El dibujo dorsal no aparece sobre el macho; no tiene estrías beige visibles sobre la espalda pero debe de tener un ligero tinte beige claro sobre todo el manto.

Los dibujos de la barbilla y de los trazos superciliares no existen.

Macho intenso

El color del pecho y de los flancos es de un amarillo muy intenso.

Macho nevado o *schimmel*

El color amarillo del pecho y de los flancos está ligeramente escarchado de nevado o *schimmel*.

Características de la hembra

La hembra es siempre menos amarilla que el macho salvo los hombros y el obispillo que están marcados de un amarillo pálido.

Todo el cuerpo de la hembra está teñido de beige claro y el manto debe de estar estriado de beige más oscuro; estas características son obligatorias en las hembras.

Las rémiges y las rectrices son de un color bruno muy diluido con un ligero ribete más claro.

Observaciones

El color de las rémiges y de las rectrices es de un bruno muy diluido en los verderones isabela satiné machos y hembras, pero el ribete es un poco más bruno en los machos que en las hembras, en las que debe de ser beige claro.

VERDERÓN SERRANO

(*Serinus citrinella*)

Características del macho



PICO	Puntiagudo, fino, gris-negruczo
OJOS	Castaño-negro
CABEZA	Fina, debajo y lados de la cabeza, nuca y lados del cuello gris-azulado liso; máscara circular amarillo-verde luminoso cubriendo la frente, la región ocular, el bajo de las mejillas y el mentón
ESPALDA	Verde-oliva marcada de estrías gris-bruna ligeras y bastantes finas
GARGANTA, PECHO	Amarillo verde luminoso como la máscara
FLANCOS	Verde bañado de gris
VIENTRE	Zona anal y sub-caudales amarillas
ALAS	Rémiges negras-verdoso con ribete externo gris verde; coberteras negruzcas con largo ribete verdoso, dibujando una doble barra alar
OBISPILLO	Amarillo-verde liso
COLA	Rectrices negro-verdoso bordeadas de gris verde
PATAS	Gris oscuro
DEDOS	Gris oscuro
UÑAS	Negras-brunas

Características de la hembra

La hembra tiene la misma librea que el macho con tintes un poco más tenues, una máscara menos extendida y estrías un poco más marcadas, el gris azulado no está interrumpido en la garganta.

Observaciones

En la especie de verderón serrano corsicana el manto es bruno-vivo y el pecho verde-amarillo más vivo; la hembra es más apagada.

Defectos clásicos del verderón serrano macho y hembra

- Falta de luminosidad en el color
- Dibujo ligero y mal delimitado
- Barras alares irregulares
- Falta de elegancia en la forma

Diámetro máximo de la anilla: 2,5 mm



ZORZAL ALIRROJO

(*Turdus iliacus*)

Características del macho y de la hembra



PICO	Bruno-negro con la base de la mandíbula inferior amarillenta
OJOS	De color negruzco
CABEZA	Largas cejas regulares de color crema; bigotes de color crema; lore de color bruno oscuro; región auricular de color bruno oscuro con un matiz crema; largo trazo debajo de los ojos color crema; corona de color bruno oscuro con escamado negro
CUELLO	Bruno oscuro con una mancha beige prolongando el bigote a cada lado del cuello
MANTO	Bruno oscuro
SUB-CAUDALES	Bruno un poco más claro que el manto
MENTÓN Y GARGANTA	Blanco sucio con un dibujo estriado bruno; la garganta está bordeada de una banda negruzca cortada y que continúa los bigotes
PECHO	Blanco sucio manchado de bruno oscuro
FLANCOS	Bruno-rojo en la parte superior de los flancos y blanco sucio estriado de bruno en la parte inferior de los flancos
VIENTRE	Blancuzco
ALAS	De color bruno oscuro con la orilla externa de las rémiges beige; las grandes su-alares están orladas de beige. Las su-alares son del mismo bruno-rojo que los flancos
OBISPILLO	Bruno un poco más claro que el manto
COLA	De color bruno oscuro
SUBCAUDALES	Blanco sucio con un dibujo escamado de bruno
PATAS Y DEDOS	De color carne oscura
UÑAS	Negras

Defectos clásicos del zorzal alirrojo en machos y hembras

- Cejas irregulares
- Dibujo del pecho irregular
- Barra alar irregular
- Bigotes irregulares
- Color de los flancos pocos visibles

Diámetro máximo de la anilla: 4 mm

ZORZAL CHARLO

(*Turdus viscivorus*)

Características del macho y de la hembra



PICO	De color cuerno oscuro con la base de la mandíbula inferior amarilla
OJOS	Brunos con círculo ocular gris-blancuzco
CABEZA	Gris-bruno a bruno; lore gris blanco; región auricular gris-blanca con ribetes más oscuros
ESPALDA	Bruno a gris-bruno con un matiz amarillento más claro
MENTÓN Y GARGANTA	Amarillento teñido de bruno con un dibujo de pequeñas manchas bruno-oscuro; dibujo de los bigotes bruno oscuro y no muy neto
PECHO	La parte alta es amarillenta con un dibujo de pequeñas manchas bruno oscuro, en forma de puntas de flecha que se agrandan y redondean progresivamente hacia arriba
FLANCOS	Amarillo-brunáceo con un dibujo de manchas bruno oscuro
VIENTRE	Amarillo-brunáceo con un dibujo de manchas bruno oscuro
ALAS	Rémiges de color bruno oscuro con un ribete más claro el largo de la orilla externa; la extremidad de las rémiges es blancuzca; las grandes, las medianas y las pequeñas coberteras son de un color bruno oscuro con un ribete más claro; su-alares blancas
OBISPILLO	Bruno a bruno-gris
COLA	Rectrices de color bruno-grisáceo con un ribete más claro a lo largo de la orilla externa
SUB-CAUDALES	Bruno a bruno gris con ribete blanco
PATAS Y DEDOS	De color amarillo-brunáceo
UÑAS	Oscuras

Observaciones

Las marcas sobre el pecho y los flancos son numerosas y repartidas muy irregularmente.

Defectos clásicos del zorzal charlo en machos y hembras

- Dibujos del pecho irregular
- Cejas irregulares
- Círculos oculares irregulares
- Dibujos de las coberteras no nítidos

Diámetro máximo de la anilla: 5 mm

ZORZAL COMÚN

(*Turdus philomelos*)

Características del macho y de la hembra



PICO	Parte superior bruno-negra; base inferior amarillenta
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Vertex y occipucio bruno vivo; vertex punteado de bruno oscuro; trazos superciliares y círculos oculares de color blanco-crema; lore negro-bruno con punteado crema; dibujo en forma de herradura vuelto hacia delante de color bruno-negrusco sobre las mejillas
ESPALDA	Bruno vivo; obispillo y su-caudales brunas
GARGANTA	Beige-claro sin manchas oscuras y bien delimitada por dos trazos oscuros
PECHO	De color crema de intensidad variable con un dibujo en forma de gota bruno oscuro y si es posible bien alineado
FLANCOS	De color crema de intensidad variable con un dibujo en forma de gota bruno oscuro
VIENTRE	Blancuzco sin dibujo punteado
ALAS	Rémiges primarias y secundarias de color bruno-oscuro vivo; el ribete externo de las rémiges primarias es más claro; las extremidades de las coberteras son más oscuras; esto hace dos barras alares; su-alares beige-rojizo
COLA	Bruno oscuro vivo
SUSCAUDALES	Blancuzcas
PATAS Y DEDOS	De color carne
UÑAS	Oscuras

Defectos clásicos del zorzal común en machos y hembras

- Manchas oscuras sobre el dibujo de la garganta
- Dibujo del pecho o de los flancos asimétricos
- Dibujo de las mejillas irregulares
- Dibujo de las alas desordenado
- Círculos oculares incompletos

Diámetro máximo de la anilla: 4,5 mm

ZORZAL COMÚN (Mutación Bruna)

Características del macho y de la hembra

PICO	De color carne
OJOS	Brunos
CABEZA	Bruno claro
ESPALDA	Bruno claro
GARGANTA	De color crema
PECHO	Crema con dibujos bruno claro en forma de gota
FLANCOS	Crema con dibujos bruno claro en forma de gota
VIENTRE	De color crema
ALAS	Pequeñas coberteras y coberteras medianas bruno claro; grandes coberteras bruno claro con dibujos escapulares crema; rémiges bruno claro
OBISPILLO	Bruno claro
COLA	Bruno claro
PATAS, DEDOS Y UÑAS	De color carne

Defectos clásicos del zorzal común bruno en machos y hembras

- Dibujo escapular irregular
- Dibujo del pecho irregular

ZORZAL COMÚN (Mutación Albina)

Características del macho y de la hembra

DESCRIPCIÓN	Blanco puro sin ningún dibujo
PICO	Amarillento
OJOS	Rojos
CUERPO	Blanco puro
PATAS	De color carne
DEDOS	De color carne
UÑAS	De color carne

Defectos clásicos del zorzal común albino en machos y hembras

- Color impuro
- Dibujos visibles sobre el pecho

ZORZAL REAL

(*Turdus pilaris*)

Características del macho



PICO	Amarillo-naranja con la extremidad y una parte de la mandíbula superior negro-brunáceo
OJOS	Castaño oscuro
CABEZA	Frente y vertex azul-grisáceo con un dibujo en punta de flecha negruzco; lore negro, parte situada debajo del ojo negra, cejas estrechas gris-blanco; escarchado de gris claro sobre la región auricular; nuca y occipucio azul grisáceo
ESPALDA	Manto y coberteras alares bruno-bermejo oscuro con dos ribetes más claros
MENTÓN Y GARGANTA	Amarillo-bermellón con un dibujo en punta de flecha negruzco
PECHO	Bruno-castaño vivo con manchas en forma de puntas de flecha negras no muy regulares
FLANCOS	Beige o gris con marcas en forma de puntas de flecha negras
VIENTRE	Blancuzco
ALAS	Rémiges de color bruno negro con ribetes externos grisáceos; extremidad de las rémiges secundarias blancuzcas, su-alares blancas
OBISPILLO	Azul-grisáceo; coberteras su-caudales brunáceas
COLA	Rectrices de color bruno negro con ribetes externos más claros sobre el par de rectrices externas
PATAS Y DEDOS	Bruno
UÑAS	Bruno oscuro

Características de la hembra

La hembra presenta las mismas características del macho pero las partes grises del macho son más brunas en las hembras. Los dibujos negros de la cabeza son más pequeños. Los flancos son más brunáceos.

Defectos clásicos del zorzal real en machos y hembras

- Dibujos del pecho mal repartido
- Color del pecho muy claro
- Cejas irregulares
- Dibujo de lo alto de la cabeza irregular

Diámetro máximo de la anilla: 4,5 mm

JILGUERO MUTACIÓN ÁGATA

(*Carduelis carduelis*)

